YaraVita®
STOPIT

Ett koncentrerat bladgödselmedel som förebygger kalciumbrist i frukt- och bärodling, potatis samt i grönsaker.

Näringsinnehåll	Viktprocent	Gram/liter
Kalcium (Ca)	12	160

Formulering: Flytande
Litervikt: 1,327 kg/l

Förpackning: 10 liter dunk
pH: 9,8



REKOMMENDATIONER

Äpple före blomning: 5 l/ha vid knoppsprickning och upprepas var 7-10 dag fram till början av blomningen.
Äpple och päron efter blomningen: Upprepade behandlingar med 10 l /ha var 7 till 14:e dag från kronbladens fall (avblomning BBCH67),fram till 1 vecka före skörd.
Vattenmängd: 150-500 l/ha.
I äppleodling mot pricksjuka, mösk, inre nedbrytning, korkrost strax efter blom, sprickor runt flugan, bättre lagringsduglighet, bättre motståndskraft mot Pezicula (Gloeosporium), Penicilium och lenticellfläckar.

Jordgubbar, friland: 10 l/ha. 3 behandlingar med 7-10 dagars intervall från begynnande blomning. Plantor som nyligen avtäckts kan vara känsliga för sprutskador. Vattenmängd: 500 l/ha.

Plommon och körsbär: 10 l/ha. 2 behandlingar med 4 och 2 veckor innan skörd. Vattenmängd: 500 l/ha.

Potatis: 5-10 l/ha. 2-3 behandlingar med strax efter begynnande knölbildning, när 50 % av stolonernas toppar har fördubblat sin diameter. Behandlingarna utförs med 10 till 14 dagars intervall. Vattenmängd: 200 l/ha.

Sallat, friland: 5/l ha. 10 till 14 dagar efter plantering eller uppkomst. Upprepa vid behov 2-3 gånger med 10 till 14 dagars mellanrum. Vattenmängd: 200 l/ha.

Fördelar:

- *Hög koncentration av kalcium*
- *Tas snabbt upp av grödan.*
- *Lång verkningstid.*
- *Väl utprovad effekt i praktisk odling mot kalciumbrist.*
- *Används fram till 1 vecka före beräknad skörd.*
- *Kan blandas med andra YaraVita-produkter och växtskyddsmedel. Se www.tankmix.com*

Denna information bygger på de erfarenheter Yara AB har om produkten. Alla rekommendationer är avsedda som en hjälp och måste anpassas till lokala förhållanden.

Yara AB
Landskrona
Tel. 0418-761 00 www.yara.se

feb 2015