

MIRADOR® 250 SC

Fungicid

Bredverkande fungicid



Verksamt ämne:

azoxystrobin 250 g/L (22,9 vikt-%)

Formulering:

Suspensions koncentrat, flytande koncentrat (SC)

Registreringsnummer: 5464

Användarkategori: 2L

Verkningsmekanism: FRAC 11

Tillverkare/Innehavare av godkännandet:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK, Leusden

Nederländerna

www.adama.com

© ADAMA Irvita N.V.

5 L e

Scanna för
användning



ANEMIRSESLT/04/A
97101563B/201811

MIRADOR® 250 SC



Fungicid

Reg. 5464. Användarkategori 2L.

Användningsområden

Mot rost (*Puccinia spp.*) i odlingar av höstkorn, höstvet, råg, rågvete och havre.

Mot svampangrepp i odlingar av hösträps.

Mot svampangrepp i frilandsodling av färska bönor och ärtor.

Mot svampangrepp i frilandsodling av morot, palsternacka, kålrot, persiljerot, dill, gräslök, kepalök, vitlök, purjolök, och gräsfrö till utsäde.

Mot *Cercospora beticola* och betrost (*Uromyces betae*) i frilandsodlingar av rödbetor.

Mot svampangrepp i odlingar av stjälselleri.

Mot mjöldagg i odlingar av jordgubbar.

Mot torrfläcksjuka i odlingar av potatis.

Mot gråbarrsjuka i växthusodlingar av barrträdplanter.

Mot gråbarrsjuka och tallsytte i frilands- och tunneldlingar av barrträdplanter.

Läs medföljande anvisningar före användning

VARNING

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion • Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.)

• Skadligt vid inandning • 13 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut inhalationstoxicitet • Samla upp spill • Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare • Undvik att inandas sprej • Undvik utsläpp till miljön.

Första hjälpen

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.

Vid obehag, kontakta GÄTTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

För mer information se säkerhetsdatablad.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.



Avfall: Företaget är anslutet till SvegReturs insamlings- och återvinningssystem (tel: 0370-173 85 eller www.svepretur.se). Rengjord förpackning kan lämnas till SvegRetur. Rester, spill och ej rengjort tomemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras.

Batchnummer och tillverkningsdatum: se förpackning.



8 718077 004129 >

UN 3082



SWEDEN

ANEMIRSESLT/04/B
97101563D/201811

MIRADOR® 250 SC



öppna här



Fungicid

Reg. 5464. Användarkategori 2L.

Användningsområden

Mot rost (*Puccinia spp.*) i odlingar av höstkorn, höstvet, råg, rågvete och havre.

Mot svampangrepp i odlingar av hösträps.

Mot svampangrepp i frilandsodling av färska bönor och ärtor.

Mot svampangrepp i frilandsodling av morot, palsternacka, kålrot, persiljerot, dill, gräslök, kepalök, vitlök, purjolök, och gräsfrö till utsäde.

Mot *Cercospora beticola* och betrost (*Uromyces betae*) i frilandsodlingar av rödbetor.

Mot svampangrepp i odlingar av stjälskelleri.

Mot mjöldagg i odlingar av jordgubbar.

Mot torrfäcksjuka i odlingar av potatis.

Mot gråbarrsjuka i växthusodlingar av barrträdplanter.

Mot gråbarrsjuka och tallsytte i frilands- och tunneldlingar av barrträdplanter.

Läs medföljande anvisningar före användning

VARNING

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion • Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.)

• Skadligt vid inandning • 13 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut inhalationstoxicitet • Samla upp spill • Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare • Undvik att inandas spray • Undvik utsläpp till miljön.

Första hjälpen

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

För mer information se säkerhetsdatablad.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.



Avfall: Företaget är anslutet till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem (tel: 0370-173 85 eller www.svepretur.se). Rengjord förpackning kan lämnas till SvepRetur. Rester, spill och ej rengjord tomemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras.

Batchnummer och tillverkningsdatum: se förpackning.



UN 3082



SWEDEN

ANEMIRSELT/04/B
97101563D/201811

Risk, skydd och första hjälpen

Användning och dosering

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Mirador® 250 SC är godkänd för användning i odlingar av höstkorn, havre, höstvetete, råg, rågvete, höstraps, frilandsodling av bönor, örter, morot, palsternacka, kålrot, persiljerot, rödbetor, frilands- och tunnelodling av stjälselleri, växthusodling av stjälselleri, frilandsodling av dill, gräslök, kepalök, vitlök, purjolök, frilands- och tunnelodling av jordgubbar, växthusodling av jordgubbar, frilandsodling av potatis, gräsför till utsäde, växthusodling av barrträdplanter, frilands- och tunnelodling av barrträdplanter enligt nedanstående tabell:

Gröda	Syfte	Behandling				Max dos/ tillfälle (L/ha)	Behandlingsmetod	Bemärk
		Utvecklingsstadium (BBCH)/ säsong	Karens-tid (dygn)	Max. antal beh/år	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)			
Höstkorn	Mot rost (<i>Puccinia spp.</i>)	37-59	35	1 gång per år		0,25	Bomspruta	
Havre	Mot rost (<i>Puccinia spp.</i>)	37-59	35	1 gång per år		0,25	Bomspruta	
Höstvetete	Mot rost (<i>Puccinia spp.</i>)	37-59	35	1 gång per år		0,25	Bomspruta	
Råg och Rågvete	Mot rost (<i>Puccinia spp.</i>)	37-59	35	1 gång per år		0,25	Bomspruta	
Höstraps	Mot svamp-angrepp	60-69	21	1 gång per år		0,6	Bomspruta	Produkten får inte användas mer än vartannat år på samma fält, eftersom azoxystrobin riskerar att läcka till grundvattnet.

Gröda	Syfte	Behandling				Max dos/ tillfälle (L/ha)	Behandlingsmetod	Bemärk
		Utvecklingsstadium (BBCH)/ säsong	Karens-tid (dygn)	Max. antal beh/år	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)			
Frilandsodling av bönor	Mot svampangrepp	59-77	7	1 gång per år		0,6	Bomspruta	Får endast användas på bönor som inte ska torkas. Produkten får inte användas mer än vartannat år på samma fält, eftersom azoxystrobin riskerar att läcka till grundvattnet.
Frilandsodling av örter	Mot svampangrepp	59-77	14	1 gång per år		0,6	Bomspruta	Får endast användas på örter som inte ska torkas. Produkten får inte användas mer än vartannat år på samma fält, eftersom azoxystrobin riskerar att läcka till grundvattnet.
Friland-sodling av morötter, palsternacka, kålrot och persiljerot	Mot svampangrepp	16-49	14	1 gång per år		0,4	Bomspruta	
Frilandsodling av rödbetor	Mot <i>Cercospora beticola</i> och betrost	16-49	14	1 gång per år		0,4	Bomspruta	

Gröda	Syfte	Behandling				Max dos/ tillfälle (L/ha)	Behandlingsmetod	Bemärk
		Utvecklingsstadium (BBCH)/ säsong	Karens-tid (dygn)	Max. antal beh/år	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)			
Frilands- och tunnelodling av stjälselleri	Mot svampangrepp	14-49	14	1 gång per år		0,6	Bomspruta	
Växthusodling av stjälselleri	Mot svampangrepp	14-49	14	1 gång per år		0,8	Bomspruta	
Frilandsodling av dill och gräslök	Mot svampangrepp	14-49	14	1 gång per år		0,6	Bomspruta	
Filandsodling av kepalök och vitlök	Mot svampangrepp	14-48	14	1 gång per år		0,6	Bomspruta	
Filandsodling av purjolök	Mot svampangrepp	14-48	21	1 gång per år		0,6	Bomspruta	
Frilands- och tunnelodling av jordgubbar	Mot mjöldagg	51-89	3	1 gång per år		0,64	Sprutning	
Växthusodling av jordgubbar	Mot mjöldagg	51-89	3	3 gånger per år	7	1,0	Sprutning	
Frilandsodling av potatis	Mot torrfläcksjuk a (<i>Alternaria solani</i>)	51-85	7	1 gång per år	Min 7	0,5	Bomspruta	
Gräsfö till utsäde	Mot svampangrepp	30-69	35	1 gång per år		0,3	Bomspruta	
Växthusodling av barrträdplanter	Mot gråbarrsjuka (<i>Lophodemella concollar</i>)	Sommar till tidig höst		3 gånger per år	21	1,0	Sprutning	

Gröda	Syfte	Behandling				Max dos/ tillfälle (L/ha)	Behandlingsmetod	Bemärk
		Utvecklingsstadium (BBCH)/ säsong	Karens-tid (dygn)	Max. antal beh/år	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)			
Frilands- och tunnel-odling av barrträdslplanter	Mot tallskytte och gråbarrsjuka (<i>Lophodermium seditiosum</i> och <i>Lophodermella concolor</i>)	Sommar till tidig höst		1 gång per år		0,6	Bomspruta	

Ytterligare villkor:

- Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Sakert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbrukspruta med bom".
- När produkten har använts för behandling av höstraps, bönor och arter får den eller andra produkter innehållande det verksamma ämnet azoxystrobin inte användas på samma fält det efterföljande året.
- När produkten har använts för behandling av barrträdslplanter i tunnel eller på friland får den eller andra produkter innehållande azoxystrobin inte användas på samma fält de två följande åren.
- Användning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning. Vid användning upp till 0,4 L produkt/ha ska utrustning som reducerar avdriften med minst 75 % användas. Vid användning över 0,4 L produkt/ha ska utrustning som reducerar avdriften med minst 90 % användas.
- Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.
- Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp.

ANVISNINGAR OM ANVÄNDNING

Verkningssätt

Mirador® 250 SC innehåller den systemiska verksamma beståndsdelan azoxystrobin vilken tillhör gruppen strobiluriner. Azoxystrobin stoppar svampens utveckling genom att blockera dess andningsprocess. Azoxystrobin verkar systemiskt i plantan och har dessutom en bladgenomträngande (translaminär) effekt. Preparatet har i första hand en förebyggande effekt men också en kurativ effekt på svampsjukdomar. Mirador® 250 SC bekämpar svampsjukdomar mest effektivt när svampen etablerar sig på plantan, därför skall behandling ske så snart de första sjukdomssymptomen kan ses eller vid risk för kommande angrepp. Plantan skyddas mot svampangrepp de kommande 2-4 veckorna beroende av växtstadium, tillväxthastighet,

sjukdomsangrepp och dosering.

Dosrekommendationer, vattenmängd och behandlingstidpunkt

Behandling utförs när de första symptomen på svampangrepp konstaterats eller när det är risk för kommande angrepp beroende på sort och väderförhållanden. Högst dosering bör användas i sjukdomsmottagliga sorter eller vid högt smitttryck, speciellt under fuktiga perioder.

Optimal behandlingstidpunkt: Behandling tidigt i svampens utvecklingsfas, dvs då symptomen på angrepp är små.

Följ rekommendationerna i tabellen nedan. Den lägre doseringen används förbyggande eller vid begynnande angrepp. På utvecklade angrepp skall den högre dosen användas. Vid användning i sträsäd skall det alltid blandas med en breddspektrad produkt. Kontrollera effekten genom att lämna en yta på minst 25 m² i fältet.

Gröda	Dos, L/ha	Tidpunkt, utv stadium	Skadegörare	Anmärkningar
Anvendelse på friland				
Höstvete	0,25	BBCH 37-59	Rost (<i>Puccinia</i> spp.) Brunfläcksjuka (<i>Parastagonospora nodorum</i>)	Vattenmängd (L/ha): 200-300 Max 1 behandling/säsong.
Råg och rågvete	0,25	BBCH 37-59	Rost (<i>Puccinia</i> spp.)	Vattenmängd (L/ha): 200-300 Max 1 behandling/säsong.
Höstkorn	0,25	BBCH 37-59	Rost (<i>Puccinia</i> spp.) Kornets bladfläcksjuka (<i>Pyrenophora terres</i>) Sköldfläcksjuka (<i>Parastagonospora nodorum</i>)	Vattenmängd (L/ha): 200-300 Max 1 behandling/säsong.
Havre	0,25	BBCH 37-59	Rost (<i>Puccinia</i> spp.)	Vattenmängd (L/ha): 200-300 Max 1 behandling/säsong.
Höstraps	0,6	BBCH 60-69	Svartfläcksjuka (<i>Alternaria</i> spp.) Bomullsmögel (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>) Torrröta (<i>Leptosphaeria maculans</i>)	Vattenmängd (L/ha): 200-500 Max 1 behandling hvert 2 år.
Potatis	0,5	BBCH 51-85	Torrfläcksjuka (<i>Alternaria solani</i>)	Vattenmängd (L/ha): 200-500 Max 1 behandling/säsong.

Gröda	Dos, L/ha	Tidpunkt, utv stadium	Skadegörare	Anmärkningar
Gräsfrö	0,3	BBCH 30-69	Rost (<i>Puccinia spp.</i>) Sköldfläcksjuka (<i>Rhynchosporium secalis</i>) Cladosporium	Vattenmängd (L/ha): 200-500 Max 1 behandling/säsong. I engelskt rajgräs ger Mirador® 250 SC måttlig till god effekt mot svartrost och mjöldagg. Effekten mot kronrost är svagare. I ängsgröe ger Mirador® 250 SC måttlig till god effekt mot rostsjukdomar på bladen samt mot mjöldagg. I ängssvingel ger Mirador® 250 SC svag effekt mot bladfläck-svampar.
Rödbetor	0,4	BBCH 16-49	Bladfläckar (<i>Cercospora beticola</i>) Betrost (<i>Uromyces betae</i>)	Vattenmängd (L/ha): 200-600 Max 1 behandling/säsong. Måttlig effekt mot betrost. Måttlig effekt mot <i>Cercospora</i> .
Åkerböna	0,6	BBCH 59-77	Rost (<i>Uromyces pisi</i>) Bönfläcksjuka (<i>Ascochyta pisi</i>) Mjöldagg (<i>Erysiphe pisi</i>) Bladmögel (<i>Peronospora viciae sp. pisi</i>) <i>Mycosphaerella pinodes</i>	Vattenmängd (L/ha): 150-800 För endast användas på bönor som inte ska torkas. Max 1 behandling vart 2 år.
Bönor skördat med eller utan baljor	0,6	BBCH 59-77	Rost (<i>Uromyces pisi</i>) Bönfläcksjuka (<i>Ascochyta pisi</i>) Mjöldagg (<i>Erysiphe pisi</i>) Bladmögel (<i>Peronospora viciae sp. pisi</i>) <i>Mycosphaerella pinodes</i> Bönrost Bönfläcksjuka	Vattenmängd (L/ha): 150-800 Max 1 behandling vart 2 år.
Ärter skördat med eller utan baljor	0,6	BBCH 59-77	Rost (<i>Uromyces pisi</i>) Ärtfläcksjuka (<i>Ascochyta pisi</i>) Mjöldagg (<i>Erysiphe pisi</i>) Ärtbladmögel (<i>Peronospora viciae sp. pisi</i>) <i>Mycosphaerella pinodes</i>	Vattenmängd (L/ha): 200-500 För endast användas på ärter som inte ska torkas. Max 1 behandling vart 2 år.

Gröda	Dos, L/ha	Tidpunkt, utv stadium	Skadegörare	Anmärkningar
Dill	0,6	BBCH 14-49	Alternaria bladfläckar (<i>Alternaria alternata</i>) Bladfläcksjuka (<i>Cercosporidium punctum</i>) Bomullsmögel (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	Vattenmängd (L/ha): 300-1200 Max 1 behandling/säsong.
Gräslök	0,6	BBCH 14-49	Rost (<i>Puccinia allii</i>) Lökbladmögel (<i>Peronospora destructor</i>) <i>Alternaria porri</i> Gråmögelbladfläcksjuka (<i>Botrytis squamosa</i>) <i>Cladosporium allii-cepae</i> Vitröta (<i>Sclerotium cepivorum</i>)	Vattenmängd (L/ha): 300-1200 Max 1 behandling/säsong.
Kålrot	0,4	BBCH 16-49	Svartfläcksjula (<i>Alternaria spp.</i>) Ringfläcksjuka (<i>Mycospora brassicola</i>) Vitrost (<i>Albugo candida</i>) <i>Phytium tracheiphilum</i> Bladfläckor (<i>Pseudocercospora capsella</i>)	Vattenmängd (L/ha): 200-600 Max 1 behandling/säsong. Använd Mirador® 250 SC som del i en strategi där andra effektiva preparat ingår.
Morötter, persiljerot och palsternacka	0,4	BBCH 14-48	Alternaria bladfläckar (<i>Alternaria dauci</i>) Mjöldagg (<i>Erysiphe heraclei</i>) Bladfläcksjuka (<i>Septoria apiicola</i>) Cercospora bladfläckor (<i>Cercosporidium carotae</i> , <i>Cercospora apii</i>) Rost (<i>Puccinia apii</i>)	Vattenmängd (L/ha): 200-600 Max 1 behandling/säsong. Använd Mirador® 250 SC som del i en strategi där andra effektiva preparat ingår.

Gröda	Dos, L/ha	Tidpunkt, utv stadium	Skadegörare	Anmärkningar
Lök (kepalök, vitlök)	0,6	BBCH 14-48	<i>Alternaria porri</i> , <i>Cladosporium allii-cepae</i> , Lökbladmögel (<i>Peronospora destructor</i>) Rost (<i>Puccinia allii</i>) Vitröta (<i>Sclerotium cepivorum</i>) Gråmögelbladfläcksjuka (<i>Botrytis squamosa</i>)	Vattenmängd (L/ha): 200-500 Max 1 behandling/säsong. Använd Mirador® 250 SC som del i en strategi där andra effektiva preparat ingår.
Purjolök	0,6	BBCH 14 -48	Purjolöksrost (<i>Puccinia porri</i>) Pappersfläcksjuka (<i>Phytophthora porri</i>) Purpurfläcksjuka (<i>Alternaria porri</i>) <i>Cladosporium allii-porri</i>	Vattenmängd (L/ha): 200-1000 Max 1 behandling/säsong. Använd Mirador® 250 SC som del i en strategi där andra effektiva preparat ingår.
Stjälselleri	0,6	BBCH 14-49	Selleribladfläcksjuka (<i>Septoria apiicola</i>) Alternaria bladfläckar (<i>Alternaria dauci</i>) Mjöldagg (<i>Erysiphe heraclei</i>) Cercospora bladfläckar (<i>Cercosporidium carotae</i> , <i>Cercospora apii</i>) Rost (<i>Puccinia apii</i>)	Vattenmängd (L/ha): 200-600 Max 1 behandling/säsong.
Jordgubbar	0,64	BBCH 51-89	Mjöldagg (<i>Sphaerotheca macularis</i>)	Vattenmängd (L/ha): 100-300 Max 1 behandling/säsong. Använd Mirador® 250 SC som del i en strategi där andra effektiva preparat ingår.
Barrotsplanter	0,8-1,0	Sommar till tidlig höst	Tallskytt och gråbass-sjuka (<i>Iophermium seditiosum</i> och <i>Iophodermella concolor</i>)	Vattenmängd (L/ha): 600 Max. 1 behandling vart 3 ^e år. Säkerhetsiden, mellan besprutning och hantering av plantorna, bör vara minst 10 dagar.

Gröda	Dos, L/ha	Tidpunkt, utv stadium	Skadegörare	Anmärkningar
Användning i växthus				
Stjälkselleri	0,8	BBCH 14-49	Selleribladfläcksjuka (<i>Septoria apiicola</i>) Alternaria bladfläckar (<i>Alternaria dauci</i>) Mjöldagg (<i>Erysiphe heraclei</i>) Cercospora bladfläckar (<i>Cercosporidium carotae</i> , <i>Cercospora apii</i>) Rost (<i>Puccinia apii</i>)	Vattenmängd (L/ha): 200-600 Max 1 behandling/säsong.
Jordgubbar	1,0	BBCH 51-89	Mjöldagg (<i>Sphaerotheca macularis</i>)	Vattenmängd (L/ha): 100-300 Max 3 behandlingar/säsong. Behandlingsintervall: 7 dagar.
Barrotsplanter	1,0	Sommar till tidlig höst	Gråbassjuka (<i>lophodermella concolor</i>)	Vattenmängd (L/ha): 600 Max 3 behandlingar/säsong. Behandlingsintervall: 21 dagar. Säkerhetstiden, melland besprutning och hantering av plantorna, bör vara minst 10 dagar.
Användning i tunnelodling				
Stjälkselleri	0,6	BBCH 14-49	Selleribladfläcksjuka (<i>Septoria apiicola</i>) Alternaria bladfläckar (<i>Alternaria dauci</i>) Mjöldagg (<i>Erysiphe heraclei</i>) Cercospora bladfläckar (<i>Cercosporidium carotae</i> , <i>Cercospora apii</i>) Rost (<i>Puccinia apii</i>)	Vattenmängd (L/ha): 200-600 Max 1 behandling/säsong.
Jordgubbar	0,64	BBCH 51-89	Mjöldagg (<i>Sphaerotheca macularis</i>)	Vattenmängd (L/ha): 100-300 Max 1 behandling/säsong. Använd Mirador® 250 SC som del i en strategi där andra effektiva preparat ingår.
Barrotsplanter	0,8-1,0	Sommar till tidlig höst	Tallskytt och gråbassjuka (<i>lophermium seditiosum</i> och <i>lophodermella concolor</i>)	Vattenmängd (L/ha): 600 Max 1 behandling vart 3 ^e år. Säkerhetstiden, melland besprutning och hantering av plantorna, bör vara minst 10 dagar.

Optimala verkningsförhållanden vid användning

Behandling tidigt i svampens utvecklingsfas, dvs då symptomen på angrepp är små. Grödan skall vara i god tillväxt och inte hämmad av torka eller tidigare behandlingar. Långtidseffekten beror på doseringen, sjukdomstrycket samt grödans utveckling. Tidiga behandlingar har kortare långtidsverkan än en oxgångsbehandling, då plantorna vid tidigare stadium växer mycket och utvecklar nya blad.

Mirador® 250 SC är regnfast efter 1 timme, vid behandling på torra blad och torr väderlek.

Restriktioner

Mirador® 250 SC som används enligt rekommenderad mängd, har i utförda försök inte visat några skadeverkningar. Det finns inga restriktioner gällande omsådd eller efterföljande gröda. Mirador® 250 SC har i försök och vid praktisk användning utomlands visat sig vara speciellt skadlig för vissa äpplesorter. Därför rekommenderas stor försiktighet vid sprutning intill äppleodlingar, trädgårdar, skogsplanteringar med äppleträd etc för att undvika avdrift. Använd gärna "low drift"-munstycken.

Blandningar

Läs alltid respektive preparats etikett före användning.

Resistens

Mirador® 250 SC tillhör strobilurinerna, vars verkningsmekanism är annorlunda från andra svampmedelsgrupper. Det finns ingen känd korsresistens till svampsjukdomar som kan ha utvecklat reducerad känslighet för svamppreparat. I stråsåd finns för närvarande utbredd strobilurinresistent mjöldagg och svartpricksjuka (*Septoria tritici*) i vete och begynnande utbredning av strobilurinresistent mjöldagg i korn samt vetets bladfläcksjuka i vete. Resistens orsakar dålig eller bristande effekt.

För att undvika ytterligare spridning av resistens, samt för att säkra bästa möjliga effekt, är det viktigt att följa nedan angivna riktlinjer för användning av strobiluriner i stråsåd:

1. Använd maximalt 2 behandlingar med strobilurinhaltiga produkter per säsong.
2. Använd Mirador® 250 SC förebyggande eller så tidigt som möjligt i infektionsförloppet.
3. Blanda Mirador® 250 SC med preparat med brett verkningspektrum (triazoler i alla stråsådesslag eller Kayak® i korn) som har en annan verkningsmekanism och som är effektiva mot de relevanta svampsjukdomarna.
4. Använd en dosering både av Mirador® 250 SC och blandningspartnern som ger en effektiv behandling.

SPRUTNING

Spridningsteknik

Behandla alltid på upptorkad gröda.

Anpassa hastigheten så att bommen går så stabilt som möjligt.

Beredning av sprutvätska

Vid påfyllning av tank:

- Fyll till hälften med vatten
- Följ rekommenderad dos enligt tabellen
- Håll den uppmätta dosen i den halvfyllda tanken

- Tillsätt eventuellt andra medel och resterande vatten under fortsatt omrörning. Sprutväska ska vara under omrörning vid transport och sprutningsarbete. Vid tillredning av sprutväska får ingen vätska komma ut i avlopp, åar eller vattentäkter. Använd en biobädd eller en platta med uppsamling.

Använd alltid skyddsutrustning vid hantering av koncentrerat preparat och sprutväska.

Rengöring av sprututrustning

Rengör sprututrustningen både utvändigt och invändigt.

Börja med invändig rengöring av sprutan:

1. Töm sprutan
2. Tillsätt därefter en tredjedel av sköljvattentankens innehåll och skölj igenom sprutan
3. Spruta ut det använda sköljvatten i grödan
4. Fyll på med ytterligare en tredjedel vatten
5. Tillsätt lämpligt rengöringsmedel till andra sköljningen
6. Cirkulera medlet och vattnet i systemet och sprid ut
7. Fyll på med en sista tredjedel vatten
8. Cirkulera vätskan i systemet och sprid ut

Fortsätt med utvändigt rengöring av spruta och traktor. Rengör sprututrustning direkt efter användning för att minska risken för kvarlämnade rester av andra medel.

SKYDDSUTRUSTNING

Vid hantering av produkten eller sprutväska ska skyddshandskar och skyddsglasögon eller ansiktsskydd användas. Andra hälsskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd. Vid spridning ska skyddshandskar användas.

Följ allmänna hygienåtgärder genom att:

- Undvika kontakt med hud, ögon och kläder
- Avstå från mat, dryck, rökning eller snusning vid arbetsplatsen
- Ta av nedsmutsade kläder
- Förvara skyddsutrustning separat
- Tvätta händer före raster
- Dusch och tvätta alla kläder efter arbetspasset

Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.

Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i med som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp. Lokalerne ska vådras omsorgsfullt efter behandling. Återinträde i lokaler där sprutning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandling.

AVFALL

Tom förpackning får inte återanvändas.

Tomförpackningar ska sköljas omsorgsfullt (minst tre gånger) med vatten som hålls i spruttanken och används vid behandlingen. Låt förpackningen rinna av, upp och ned under minst 30 sekunder. ADAMA är anslutet till SvegReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar. Rengjord förpackning kan lämnas till SvegRetur. Tel 0370-173 85 eller

www.svepretur.se för information om uppsamlingsplatser. Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid kommunens återvinningscentral. Preparatrester, sköljvatten och ej rengjorda förpackningar är miljöfarligt avfall. Kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning för information om hantering av miljöfarligt avfall.

FÖRVARING

Lagras frostfritt samt åtskilt från födoämnen och utsäde.

ATT BEAKTA

Produktens kvalitet garanteras om varan har erhållits i sluten originalförpackning. Rekommendationer för produktens användning är inte bindande, men de är baserade på våra senaste kunskaper. Många faktorer såsom väder, jordart, sorter, resistens, sprutteknik, vattenkvalitet och andra användningssätt kan påverka produktens effekt. ADAMA fräntar sig ansvar i dessa avseenden. Företaget fräntar sig också allt ansvar för skada uppkommen genom felaktig lagring eller användning av produkten.

MIRADOR® 250 SC

Fungicid

Bredverkande fungicid

Verksamt ämne:
azoxystrobin 250 g/L (22,9 vikt-%)
Formulering:
Suspensions koncentrat, flytande koncentrat (SC)
Registreringsnummer: 5464
Användarkategori: 2L
Verkningsmekanism: FRAC 11

Tillverkare/Innehavare av godkännandet:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK, Leusden
Nederländerna
www.adama.com

©ADAMA Irvita N.V.

4 x 5 L



ADAMA

ANEMIRSESLT/04/C1
97101563F/201811

MIRADOR® 250 SC

MIRADOR® 250 SC

Fungicid

Bredverkande fungicid



Verksamt ämne:

azoxystrobin 250 g/L (22,9 vikt-%)

Formulering:

Suspensions koncentrat, flytande koncentrat (SC)

Registreringsnummer: 5464

Användarkategori: 2L

Verkningsmekanism: FRAC 11

Tillverkare/Innehavare av godkännandet:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK, Leusden

Nederländerna

www.adama.com

©ADAMA Irvita N.V.

4 x 5 L

Scanna för
användning



Reg. 5464. Användarkategori 2L.

Användningsområden

Mot rost (*Puccinia spp.*) i odlingar av höstkorn, höstvet, råg, rågvete och havre.

Mot svampangrepp i odlingar av höstraps.

Mot svampangrepp i frilandsodling av färska bönor och ärtor.

Mot svampangrepp i frilandsodling av morot, palsternacka, kålrot, persiljerot, dill, gräslök, kepalök, vitlök, purjolök, och gräsfö till utsäde.

Mot *Cercospora beticola* och betrost (*Uromyces betae*) i frilandsodlingar av rödbetor.

Mot svampangrepp i odlingar av stjälskelleri.

Mot mjöldagg i odlingar av jordgubbar.

Mot torrfläcksjuka i odlingar av potatis.

Mot gråbarrsjuka i växthusodlingar av barrträdplanter.

Mot gråbarrsjuka och tallskytte i frilands- och tunneldlingar av barrträdplanter.

Läs medföljande anvisningar före användning

VARNING

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion • Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.)

- Skadligt vid inandning • 13 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut inhalationstoxicitet • Samla upp spill
- Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare • Undvik att andas sprei • Undvik utsläpp till miljön.

Första hjälpen

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

För mer information se säkerhetsdatablad.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.



Avfall: Företaget är anslutet till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem (tel: 0370-173 85 eller www.svepretur.se). Rengjord förpackning kan lämnas till SvepRetur. Rester, spill och ej rengjort tomemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras.

Batchnummer och tillverkningsdatum: se förpackning.

UN 3082



8 718077 005256 >



SWEDEN

ANEMIRSE51T/04/C2
971015635/201811

MIRADOR® 250 SC



SWEDEN

30 x 20 L



ANEMIRSE5LT/04/X
97101563M/201811

ADAMA

Northern Europe B.V.