



Legacy, höst och vår!!

Godkännande

Godkänd för höst- och vårbekämpning av örtogräs i höst och vårvete, höst- och vårkorn, råg, rågvete och havre. Dos i höstsäd på hösten mellan 0,06 och 0,25 l/ha, höstsäd på våren mellan 0,06 och 0,20 l/ha. I vårkorn är dosen mellan 0,06 och 0,15 l/ha samt i havre 0,06 till 0,08 l/ha. Används från strax efter sådd fram till grödans DC 31 (begynnande stråskjutning). I havre rekommenderar vi behandling mellan DC 13 till DC 31. Tillsätt vätningsmedel till en Legacysprutning.

Ogräseffekt Legacy

Effekten på de olika ogräsen beror till stor del på ogräsen storlek. Små eller ännu ej uppkomna ogräs är betydligt mer lättbekämpade än stora ogräs. Legacy har framför allt mycket god effekt mot de ganska svårbekämpade ogräsen viol, veronika och plister. Mycket god effekt även mot våtarv vilket är viktigt att tänka på nu när det förekommer mer och mer resistens mot sulfonylureorna.

Höstsäd:

Ogräsart	Ogräsens utvecklingsstadie		
	0-2 örtblad	3-4 örtblad	5-6 örtblad
Åkerviol	0,06 l/ha	0,12 l/ha	0,12 l/ha
Förgätmigej			0,25 l/ha**
Lomme		0,25 l/ha**	*
Våtarv			0,25 l/ha**
Veronika			
Plister			
Pilört			
Trampört			
Baldersbrå	*	*	
Snärimåra	*	*	*

* Med 0,25 l/ha Legacy uppnås en hämning av aktuella ogräsen tillväxt



** Observera att maxdosen vid vårbehandling av höstsäd är 0,20 l/ha

Vårkorn, vårvete och havre:


Ogräsart	Ogräsen utvecklingsstadium	
	0-2 örtblad	3- örtblad
Åkerviol	0,06 l/ha	0,15 l/ha
Förgätmigej		
Lomme		
Våtarv		
Veronika	0,15 l/ha	*
Plister		
Pilört		
Trampört		
Baldersbrå	*	
Snärjmåra		

* Med 0,15 l/ha Legacy uppnås en hämning av aktuella ogräsen tillväxt

Nedanstående förväntade ogräseffekter i höstvetete är hämtade från Plantevearn online och bygger på danska försöksresultat.



Ogräseffekt när Legacy blandas med Lexus och/eller Boxer på hösten
För att förstärka effekten mot vissa ogräs redan på hösten rekommenderar vi att man tankblandar Legacy med Lexus och/eller Boxer.
Vid blandning med Boxer skall vätningsmedel ej tillsättas.



Optimala förhållanden

- Legacy kan användas ner till +2°C om temperaturutvecklingen är stigande. Om frost förutspås, skall behandlingen utföras först då plantorna är saftspända igen
- God markfukt i samband med behandling gynnar behandlingseffekten
- På mullrika jordar är effekten av Legacy nedsatt

Kontakta oss vid frågor!

Rikard Larsson

Mob: 070-292 22 28

r.larsson@mabeno.com

Lars Kruse Andersen

Mob: +45 51 24 90 70

l.andersen@mabeno.com

Besök gärna vår hemsida för etiketttexter, säkerhetsdatablad mm!

www.mabeno.com