

För betning av utsädespotatis mot olika svamp-sjukdomar

- Utmärkt utsädesbehandling mot flertalet viktiga lagringssjukdomar
- Flexibilitet i behandlingstidpunkt

Allmän information

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av potatis genom betning av utsäde.

Registreringsnummer 4699

Verksam beståndsdel Imazalil 100 g/l (9,3 vikt-%)

Behörighetsklass 2

Klassificering/märkning Fara/ GHS05; H318/ GHS08; H351/ GHS09; H410. Se sida 120

Förpackning 5 l

Lagring Förvaras frostfritt

UPMA Gurka i växthus. Se sida 117

Registreringsinnehavare Certis Belchim B.V.



Användning

Diabolo används för behandling av sättpotatis mot silver-skorv (*Helminthosporium solani*), phoma-röta (*Phoma exigua*), torröta (*Fusarium solani* respektive *Fusarium sulphureum*) samt blåsskorv (*Polyscytium pustulans*).

Bäst effekt fås vid behandling omedelbart efter skörd eller i samband med inlagring. Behandling kan också ske vid upp-sortering av potatis inför våren innan knölarna är väckta.

OBS! Knölen måste vara i vilstadium. Inga vita groddar.

Dos Endast en behandling med 150 ml/ton sättpotatis.

OBS! Behandlad potatis får bara användas till utsäde.

Diabolo används utspädd och sprutas ut med finfördelande munstycken eller "spinning disc-system" över det rullband som transporterar potatisen. Det är viktigt att potatisen "rullar" så att hela knölen blir täckt av preparatet.

Skyddsplåtar eller liknande vid sidan av rullbandet respektive sprutmunstyckena förhindrar avdrift och ger en jämnare beläggning.

Potatisen bör vara så ren och fri från jord som möjligt. Diabolo kan också spädas med vatten, max 2 l/ton potatis.



Ytterligare villkor för användning

Skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd ska användas vid tillblandning och påfyllning av brukslösning samt vid kalibrering och rengöring av betningsmaskin.

Vid hantering av betat utsäde ska skyddshandskar användas.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Användningsvillkor Diabolo

Gröda	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/säsong (min-max)	Max antal behandlingar/år	Behandlings- intervall (dagar)	Karenstid (dagar)	Max dos vid varje behandling
Potatis	Mot svampangrepp	Betning	-	1	-	-	150 ml/ton utsäde