

BESKRIVNING

Borsyra används som borgödselmedel.

Ämnet räknas som utfasningsämne, eftersom det är reproduktionstoxiskt. Utfasningsämnena är kemiska ämnen som inte bör användas p g a att även exponering av små doser leder till stor risk för ärftliga mutationer eller skador på reproduktionen (på fruktsamheten eller på utvecklingen av embryo/foster/barn) eller skador som på sikt kan utvecklas till cancer.

Om möjligt, använd istället vår produkt Bor Flytande, som är en flytande formulering av bormonoetanolamin, som medför mindre risk för inandning.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Borgödselmedel till bladgödsling i frilandsgöröör och för näringsbevattniö i växthus och på friland.

REKOMMENDATION

Normaldos till bladgödsling är 1-2 kg/ha.

Dos i näringslösningar är normal 0,3-0,5 ppm, vilket motsvarar 3-5 gram per 100 liter stamlösning som före utvattniö späds ut med ett blandningsförhållande på 1:100.

Går att blanda med ett flertal gödsel- och bekämpningsmedel, men provblanda alltid mindre mängder först.

Rutingödsling kan orsaka förgiftningssymptom, varför behandling alltid bör föregås av plantsaftanalys eller spurwayanalys.

TEKNISK INFORMATION

Ämne	Innehåll vikt %	Blandbarhet	Densitet	Farligt gods
Bor	17,5 %	Vattenlöslig	1,0 kg/l	Nej
		Förpackning	pH	Övrigt
		25 kg	5,1	Giftigt!
		Form	Enhet	
		Kornigt pulver	kg	

Kontakt:

Telefon: 042-29 20 05

E-post: info@lmiab.se

Hemsida: www.lmiab.se