

AGACID FF +

REVIDERAD DEN: 05/06/24

Koncentrerad lösning, endast för yrkesmässigt bruk
BYGGNADER AVSEDDA FÖR BOSKAP
JORDBRUK OCH LIVSMEDELSINDUSTRI
DESINFICERING GENOM DOPPNING, SPREJNING, SKUMAPPLICERING – YTOR,
MATERIAL, UTRUSTNING, STÖVLAR, TRANSPORTFORDON (INKLUSIVE DÄCK)
AVSEDDA FÖR DJUR – BYGGNADER AVSEDDA FÖR BOSKAP
DESINFEKTION GENOM BLÖTLÄGGNING, SPREJNING, SKUMAPPLICERING –
YTOR, MATERIAL, UTRUSTNING – LIVSMEDELSINDUSTRI
DESINFEKTION AV YTOR GENOM VIA LUFT – BYGGNADER AVSEDDA FÖR
BOSKAP

BIOCIDPRODUKTER

verksamma ämnen per 100 g produkt: Didecyldimetylammoniumklorid 1,5g +Kvartära
ammoniumföreningar, bensylalkyldimetyl, klorider 8g +Glutaraldehyd 13g

HUVUDGRUPP 1: Desinfektionsmedel och allmänna biocidprodukter; Produkttyp 3: Hygienbiocidprodukter för veterinärverksamhet; Produkttyp 4: Desinfektionsmedel för ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder

Fysikalisk-kemiska egenskaper

Utseende	Klar vätska
Färg	Färglös till ljusgul
Lukt	Aldehyd, furu
Absolut pH-värde :	3,8
pH vid 10g/l	4,4±1
Densitet	1,027±0,01 g/cm ³
Frys punkt	-3 °C

Egenskaper :

Desinfektionsmedel baserat på glutaraldehyd och kvartärt ammonium.
Brett verkningspektrum
Skummande egenskaper

Bruksanvisning:

AGACID FF + är avsedd att användas för:

- desinfektion av ytor, material, utrustning, stövlar i byggnader avsedda för djur, transportfordon för djur (inklusive hjul).
- desinfektion av ytor, material, utrustning i kontakt med foder eller livsmedel i byggnader avsedda för djur, livsmedelsindustri.

För användning på ytor, material och utrustning som inte kommer i direktkontakt med mat eller foder i byggnader avsedda för djur:

Appliceras genom doppling, sprejning eller skumapplicering vid lågt tryck:

Förtvätta och skölj ytor, material och utrustning som ska desinficeras. Förbered en lösning av AGACID FF + med

AGACID FF +

REVIDERAD DEN: 05/06/24

den rekommenderade lösningsgraden.

Koncentration:

Bakteriedödande: 0,75 %

Jästdödande: 0,5 %

Virusdödande: 1,5 %

Applicera den spädda lösningen genom doppning, genom att spreja/skumma vid lågt tryck och en hastighet på 200 ml/m² till avrinningsgränsen.

Kontaktid: 30 minuter

Temperatur: 10 °C

Vänta 2 timmar innan användare och djur tillåts in i djurbyggnader/transportfordon efter sprejning/skumapplicering.

Applicering via luftburen desinfektion:

Rekommenderas innan djuren återinförs, i ett rent, stängt och förslutet utrymme. Appliceras utan närvaro av djur eller människor.

Slutligt steg vid luftburen desinfektion (pulsFOG termisk dimma).

Bakterie-, jäst-, svamp- och virusdödande koncentration vid 4,88 ml (25 % spädd lösning)/m³ motsvarande 1,22 ml (som ren produkt)/m³.

Bered en lösning av 25 % AGACID FF +.

Exempel: 122 ml AGACID FF + och 366 ml vatten utgör en total lösning på 488 ml, vilket kan täcka en yta på 100 m³.

Kontaktid: 4 t.

Temperatur: Minst 20 °C

Vänta 7 timmar innan användare och djur släpps in i byggnader avsedda för djur.

För användning på ytor, material och utrustning som kommer i direktkontakt med mat eller foder i byggnader avsedda för djur och livsmedelsindustri:

Appliceras genom doppning, sprejning eller skumapplicering vid lågt tryck:

Förtvätta och skölj ytor, material och utrustning som ska desinficeras. Förbered en lösning av AGACID FF + med den rekommenderade lösningsgraden.

Koncentration:

Bakteriedödande och jästdödande: 0,5 %

Virusdödande: 1,5 %

Applicera den spädda lösningen genom doppning, genom att spreja/skumma vid lågt tryck och en hastighet på 200 ml/m² till avrinningsgränsen.

Kontaktid: 30 minuter

Temperatur: 10 °C

Gör en sista sköljning med dricksvatten.

Kontrollparametrar :

Vänligen rådgör med din tekniker för frågor om kontrollparametrar.

Förpackning :

Dunk

22l

Vit och ogenomskinlig

23kg

Förvaras på ren, ventilerad plats, åtskilt från värmekällor och starkt ljus.

AGACID FF +

REVIDERAD DEN: 05/06/24

Kvalitet och säkerhet

Se det säkerhetsdatablad som finns tillgängligt på INTERNET: <http://www.kersia-group.com>
 Använd produkten inom 24 månader från tillverkningsdatum.

Föreskrifter

AGACID FF + är en blandning i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering och godkännande av kemikalier (Reach), utan avseende på tillverkningsplats.
 Ämnen som omfattas av Reach-förordningen och som ingår i AGACID FF + har förhandsregistrerats eller registrerats av vårt företag eller av våra leverantörer uppåt i distributionskedjan.
 AGACID FF + innehåller inget ämne som inger mycket stora betänkligheter i kandidatlistan över ämnen för godkännande som offentliggörs och uppdateras regelbundet av ECHA.

Effektivitet

Aktivitet	Standard	Testade organismer	Interfererande substans	Kontaktid:	Temperatur:	Koncentration:
Bakteriedödande medel	EN 14349	Enterococcus hirae, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus	3 g/l bovint albumin	30min	10°C	0,75%
	EN 1656	Enterococcus hirae, Proteus hauseri, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus	3 g/l bovint albumin	30min	10°C	0,5%
		Salmonella enteritidis	3 g/l bovint albumin	30min	10°C	0,5%
		Salmonella Typhimurium	3 g/l bovint albumin	30min	10°C	0,25%
	EN 17272	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Proteus hauseri	3 g/l bovint albumin	4timmar	20°C	4,88 ml (25 % v/v spädd lösning)/m3
	EN1276	Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus	0,3 g/l bovint albumin	30min	10°C	0,5%
Svampdödande	EN13697	Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus	0,3 g/l bovint albumin	30min	10°C	0,5%
	EN 17272	Aspergillus brasiliensis	3 g/l bovint albumin	4timmar	20°C	4,88 ml (25 % v/v spädd lösning)/m3
Jästicid	EN 16438	Candida albicans	3 g/l bovint albumin	30min	10°C	0,5%
	EN 1650	Candida albicans	0,3 g/l bovint albumin	30min	10°C	0,5%
	EN 1657	Candida albicans	3 g/l bovint albumin	30min	10°C	0,5%
	EN 17272	Candida albicans	3 g/l bovint albumin	4timmar	20°C	4,88 ml (25 % v/v spädd lösning)/m3
	EN13697	Candida albicans	0,3 g/l bovint albumin	30min	10°C	0,5%
Virusdödande medel	EN 14675	Bovine Enterovirus type 1 (ECB0)	3 g/l bovint albumin	30min	10°C	1,5%
		Avian Influenza (H1N1), Avian Influenza (H5N2)	3 g/l bovint albumin	30min	10°C, 4°C	0,5%
		African swine fever virus (ASF)	3 g/l bovint albumin	30min	10°C	1%
	EN 16777	murine norovirus	0,3 g/l bovint albumin	30min	10°C	1,5%
	EN 17272	Porcine Parvovirus, strain NADL2	3 g/l bovint albumin	4timmar	20°C	4,86 ml (25 % v/v spädd lösning)/m3
	EN14476	Adenovirus type 5, murine norovirus	0,3 g/l bovint albumin	30min	10°C	1%