

Flurostar 200

Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg, rågvete, durumvete, fodermajs, gräsfrövall, betesvall och slåttervall. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

Innehåll: Produkten är ett emulsionskoncentrat (EC) innehållande 200 g/l Fluroxypyr

Satsnummer: se förpackningen

Innehåll:
5Le

Reg.nr 5019. Behörighetsklass 2L. Endast för yrkesmässigt bruk.

Läs medföljande anvisningar före användningen

Endast för lagerhantering:



Nordisk Alkali

member of the Belchim Group 

Distributör: Nordisk Alkali AB
Hanögatan 8, SE-211 24 Malmö,
Tel.: +46 (0)40 680 85 30, Fax: +46 (0)40 93 84 00, info@nordiskalkali.se, www.nordiskalkali.se

Registreringsinnehavare: Globachem nv
Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint-Truiden, Belgium
www.globachem.com



Globachem
Your Crop Counts

FARA



Faro- och Skyddsangivelser:

H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H315 - Irriterar huden.

H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

EUH066- Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P261 - Undvik att andas sprej.

P280 - Använd skyddshandskar, ögonskydd, ansiktsskydd.

P301+P310+P331 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Framkalla INTE kräkning.

P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

P304+P340+P312 - VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P362+P364 - Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

P501 - Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare

P403+P233 - Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten

EUH 401 - För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen
SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag.

I nödsituation ring 112 och begär giftinformation.

BRUKSANVISNING

FLUROSTAR 200 är ett systemiskt ogräsmedel med auxinliknande verkan för bekämpning av örtogräs i vår- och höstsäd, majs, gräsfrövall, betesvallar och slåttervallar.

FLUROSTAR 200 upptas primärt genom bladen. På känsliga ogräsarter kan man normalt se effekt 1-2 dagar efter behandling. Tillväxten upphör och ogräset vissnar bort under loppet av 2-3 veckor. FLUROSTAR 200 är regnfast 1 timme efter behandling.

Rekommendationer

FLUROSTAR 200 användes vid bekämpning av örtogräs på våren.

Minimum temperatur 7-8 °C

Gröda	Behandlingstidpunkt	Dosering	Kommentar
Höstsäd - höstvetete, höstkorn, råg, rågvete, durumvete	BBCH 20 - 45	1,0 l/ha	Endast vårbehandling.
Vårsäd - vårkorn, vårvete	BBCH 20 - 39	0,75 l/ha	
Vårsäd - havre	BBCH 20 – 31	0,75 l/ha	Obs! behandla inte i havresorten Matilda
Fodermajs	BBCH 13 - 16	1,0 l/ha	
Nyetablerad gräsfrövall till utsäde, betesvall och slåttervall	t.o.m. juli	0,75 l/ha	Använd inte FLUROSTAR 200 vid insådd av klöver, lucern eller andra baljväxter. Släpp inga djur på behandlat område förrän 7 dagar efter behandlingen.
Etableerad gräsfrövall till utsäde, betesvall och slåttervall	t.o.m. juli	2,0 l/ha	Använd inte FLUROSTAR 200 vid insådd av klöver, lucern eller andra baljväxter. Släpp inga djur på behandlat område förrän 7 dagar efter behandlingen.

Vattenmängd: 150-400 l/ha i stråsäd, 200- 300 l/ha i majs, 300-400 L/ha i gräsvall.

Ogräseffekter

Mycket god effekt mot följande ogräs snärjmåra, förgätmigej, våtarv, dåan (för dåan max. 4-6 blad vid behandling), åkerbinda och trampört. Bästa effekt på ogräs med färre än 4 blad och i god tillväxt. Dessutom uppnås i stråsäd mycket god och god till mycket god effekt på följande ogräs då de har 2-4 blad; åkermolke, åkervinda, harkål, nattglim, nattskatta, penningört, plister och nässla, sminkrot, snärvinda, vicker.

Sprutteknik

Vid sprutning rekommenderas användning av spaltspridare som ger medium till fin duschkvalité. Vid grödans 2-6 bladstadium användes normalt 100-200 liter vatten och vid senare sprutning 200 liter vatten per ha.

FLUROSTAR 200 är relativt oberoende av luftfuktigheten, vilket innebär, att man uppnår samma säkra effekt mitt på dagen som vid morgonsprutning. FLUROSTAR 200 kan användas för behandling då ogräset är i aktiv tillväxt och temperaturen

7-8 °C snabbare effekt erhålles över 12°C. Vid lägre temperaturer kan effekten på ogräset bli svagare.

Sprutning med FLUROSTAR 200 **avrådes** när grödan är under stress på grund av torka, vattensjuk jord, mycket hög dagstemperatur samt om det är risk för låg nattetemperatur eller period med frost kring behandlingstidpunkten.

Personlig skyddsutrustning

Skyddshandskar och skyddsglasögon eller ansiktsskydd ska användas vid hantering av produkten.

Skyddshandskar och skyddsglasögon eller ansiktsskydd ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska.

Jordart

FLUROSTAR 200 kan användas på alla jordarter.

Beredning av sprutvätska

Fyll ca halva behållaren med vatten, börja omrörningen och tillsätt den beräknade mängden FLUROSTAR 200. Vid tankblandning med mangansulfat eller magnesiumsulfat skall dessa lösas upp innan FLUROSTAR 200 tillsätts.

Resterande mängd vatten tillsätts. Fortsatt omrörningen under transport och besprutning.

Rengöring av sprututrustning

Innan sprutan användes till andra grödor än stråsäd skall utrustningen rengöras grundligt från rester av FLUROSTAR 200.

1. Efter avslutad sprutning sköljs sprutan grundligt med rent vatten, sköljvattnet kan ev. sprutas över den gröda som just sprutats. Glöm inte att rengöra utrustningen utvändigt.
2. Fyll sprutan med vatten. Tillsätt All Clear Extra enl. rekommendation, spola genom slangar och bom. Fyll därefter tanken med vatten och låt stå i 15 minuter med omrörningen igång. Töm sprutan genom bom/spridare, skölj tank/bom med rent vatten.
3. Spridare, silar och filter rengörs separat med samma rengöringsmedel och koncentration som användes till sprutan.
4. Skölj sprutan med vatten grundligt i 5 minuter, samtidigt med att sköljvattnet sprutas ut genom bom/spridare. Sköljvattnet sprids på arealer, där det inte kan förorena vattendrag, brunnar eller avloppsledningar.

Observera

Växtmaterial från gröda behandlad med FLUROSTAR 200 bör inte användas i växthus eller i kompost.

Tomma emballage

De tomma flaskorna sköljs ordentligt med vatten minst tre gånger. Sköljvattnet håller man i sprutan. Väl rengjorda och torra plastförpackningar med avtagen skruvkork skall enligt överenskommelse lämnas för energiutvinning till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar. Observera att förpackningarna skall sköljas ordentligt minst 3 gånger och ställas upp och ned under minst 30 sekunder för avrinning. Företaget är anslutet till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar (www.svepretur.se).

Att beakta

Bruksanvisning och rekommendationer är baserade på omfattande försök och fleråriga erfarenheter. Nytt sortmaterial, förändrad odlingsteknik eller uppkommen resistens kan resultera i att preparatet inte ger önskad effekt eller till och med att skador uppstår på grödan. Tillverkaren ansvarar inte för uppkommen skada på grund av sådana förhållanden eller liknande omständigheter, vilka inte kunnat förutses vid preparatets saluförande. Följ alltid rutinerna för säkert växtskydd.