

APPROVED

By 20009992 at 2:13 pm, Mar 14, 2023

CLIOPHAR® 600 SL

OGRÄSMEDEL

**Reg.nr 5506. Behörighetsklass 2L.
Endast för yrkesmässigt bruk.**

Mot örtogräs i odlingar av sockerbeter, foderbeter och rödbeter.
Mot örtogräs i odlingar av rödkål, vitkål, spetskål och savojkål på friland.
Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre.
Mot örtogräs i odlingar av lin.
Mot örtogräs i skogsplantaskolor och i skogsplanteringar på åkermark.
Mot örtogräs i odlingar av betesvall, slåttervall och gräsfrö till utsäde.
Mot örtogräs i odlingar av raps och rybs.
Mot örtogräs i odlingar av majs (gäller ej sockermajs).

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

Läs medföljande anvisningar före användningen

Innehåll: Produkten är ett lösligt koncentrat (SL) innehållande 600 g/l kloparylid.

Förvaras frostfritt!

Ytterligare villkor för användning

Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".

Registreringsinnehavare:

Arysta LifeScience Benelux SPRL
26/1 rue de Renory
B-4102 Ogrée
Belgien

Faro- och Skyddsangivelser:

P501– Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare EUH401– För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen
SP1 Förörena inte vatten med produkten eller dess behållare.

Första hjälpen

Inandning: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Hudkontakt: Tvätta huden med mycket vatten.
Kontakt med ögonen: Skölj ögonen med vatten i säkerhetssyfte.
Förtäring: Vid obehag, kontakta giftinformationscentral eller läkare.

I nödsituation ring 112 och begär giftinformation.

1 L

**BRUKSANVISNING**

CLIOPHAR 600 SL är ett systemiskt verkande ogräsmedel mot örtogräs. Full effekt av behandlingen ses först efter 3–4 veckor. Det är viktigt att välja en dos som är lämplig för ogräsets storlek. Bäst resultat fås när ogräsen är aktivt växande vid behandling. Preparatet är ett bladverkande ogräsmedel som omfördelas till rötter, rotstockar och utlöpare. CLIOPHAR 600 SL är särskilt effektiv mot ogräs som tillhör familjen korgblommiga växter, till exempel ettåriga och fleråriga tistlar och kamomiller.

Användningsvillkor

Endast för vårbehandling

Gröda eller område	Max enskild dos L/ha	Behandlingstillfälle BBCH	Antal behandlingar
Vårrips och vårrybs	0,2	12–55	1
Höstraps och höstrybs	0,2	31–55 Endast vårbehandling, Tidigast 1 april.	1
Vete, korn, råg, rågvete och havre	0,2	2–32 Endast vårbehandling, Tidigast 1 april.	1
Sockerbete, foderbete och rödbete	0,2	12–15	1
Rödkål, vitkål, spetskål och savojkål	0,2	12–15	1
Fodermajs	0,2	13–16	1
Lin	0,2	3–5 Turner skalan: första örtbladet utvecklat till stjälken sträcks	1
Skogsplantaskolor och skogsplanteringar på åkermark Handhållen spruta.	0,2	Endast vårbehandling, typiskt kring unga träd, 40 – 60 cm höga	1
Slåttervall och betesvall*, gräsfrö till utsäde	0,2	Endast vårbehandling	1

*Håll boskap borta från det behandlade området i 7 dagar efter behandling.

Tillsättning av olja rekommenderas i oljeväxter, stråsad, vall, majs och betor.

Vattenmängd: 100–300 L/ha

Optimala förhållanden

För bästa resultat behandla med CLIOPHAR 600 SL när ogräset är i aktiv tillväxt. Kontroll av kamomiller kan nedsättas om växterna lider av stress från torka vid behandlingstillfället.
Kontroll av vanlig åkertistel och andra fleråriga ogräs kan bli nedsatt av jordbearbetning inom en period av två veckor före eller efter behandling med CLIOPHAR 600 SL.

CLIOPHAR 600 SL bör inte användas när grödan är fuktig eller när nederbörd förväntas inom sex timmar. Behandla inte om grödan är under stress från kyla, torka, skador från skadegörare, näringsbrist eller dylikt. CLIOPHAR 600 SL bör användas vid dagtemperaturer över 10–12 °C. Behandling skall undvikas vid risk för frostnätter före eller direkt efter behandling.

Restriktioner

Rådfråga växtförädlare innan preparatet används på nya sorter. Uppköpare bör rådfrågas före användning i grödor som ska användas som utsäde.
Behandla inte grödor som är insädda med klöver eller andra baljväxter i blandningar.
Undvik avdrift till känsliga grödor (såsom utsädespotatis).

Beredning av sprutvätska

Fyll tanken till hälften med vatten och tillsätt rätt mängd CLIOPHAR 600 SL, blanda väl, fyll upp med resten av vattnet. Fortsatt omrörningen under transport och besprutning.

Tankblandningar

CLIOPHAR 600SL bör endast tillsättas i tankblandning med andra produkter om krav och restriktioner på andra produktetiketter inte strider mot kraven och restriktionerna på denna etikett. Tankblandningar bör inte tillåtas att stå i tanken och omrörning bör upprätthållas vid alla tidpunkter.

Om produkten används i en tankblandning ska andra produkter blandas med vatten först efter deras krav och CLIOPHAR 600 SL ska tillsättas sist. Tankblandningen måste omröras kontinuerligt tills behandlingen är avslutad.

Spridningsteknik

Applitera Cliophar 600 SL med en medelstor droppstorlek.

Rengöring av sprututrustning

Rengör sprututrustningen noga med vatten och ett flytande rengöringsmedel direkt efter användning.

Spruta ut. Fyll med rent vatten och låt stå över natten. Spruta sedan ut vattnet före användning av annan produkt, speciellt vid byte från ogräsmedel till insektsmedel. Spår av CLIOPHAR 600 SL kan skada känsliga grödor (till exempel utsädespotatis) som behandlas senare.

Personlig skyddsutrustning

Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hantering av produkten eller vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska.

Observera:

Använd inte något växtmaterial behandlat med CLIOPHAR 600 SL för kompostering eller förmultning.

Använd inte gödsel från djur som utfodrats med grödor som är behandlat med CLIOPHAR 600 SL för kompostering.

Efterföljande gröda

Resthalter av CLIOPHAR 600 SL i växtmaterial (inkluderat gödsel) som inte har brutits ned fullständigt kan ha effekt på mottagliga grödor. Följande grödor är känsliga för CLIOPHAR 600 SL: ärtor, bönor och andra baljväxter; morötter och andra flockblommiga växter; potatis; sallad och andra korgblommiga växter; samt växthusväxter.

Undvik etablering av känslig gröda året efter behandling med CLIOPHAR 600 SL.

Hacka och införliva alla behandlade växtrester tidig höst (eller så fort som möjligt efter skörd) för att släppa ut eventuella resthalter till jorden, där resthalterna snabbare bryts ner. God lantbrukarsed säkerställer att stubb och halm (inklusive stallgödsel) och andra behandlade växtrester helt bryts ner innan plantering av känsliga grödor.

Resistenshantering:

Den aktiva ingrediensen kloparylid tillhör HRAC-gruppen O (syntetiska auxiner). Risken för att resistens skall uppstå mot det här preparatet i dessa användningsområden är för tillfället låg. Preparat som hör till samma grupp och har samma verknings sätt bör inte användas på samma skifte flera år efter varandra för att förhindra att resistenta ogrässtammar uppstår.

Avfallshantering

Rester, spill och ej rengjort tomemballag är farligt avfall och ska destrueras i enlighet med gällande lagstiftning. Rengjort tomemballag (efter minst 3 sköljningar med vatten) och ytteremballag som ej har varit i direkt kontakt med medlet kan lämnas på närmaste återvinningscentral för energätvinnning. Tom förpackning får inte återanvändas.

Rengjord förpackning kan lämnas till SvegRetur (www.svepretur.se)

Att beakta

Bruksanvisning och rekommendationer är baserade på omfattande försök och fleråriga erfarenheter. Nytt sortmaterial, förändrad odlingsteknik eller uppkommen resistens kan resultera i att preparatet inte ger önskad effekt eller till och med att skador uppstår på grödan. Tillverkaren ansvarar inte för uppkommen skada på grund av sådana förhållanden eller liknande omständigheter, vilka inte kunnat förutses vid preparatets saluförande. Följ alltid rutinerna för säkert växtskydd.

2203089 ELI. 2023-03 v03