

Effektiv och flexibel produkt för behandling av ogräs i höstspannmål

- Hög maxdos ger möjlighet att anpassa behandlingen efter aktuella floran
- Flexibel att använda i strategier, ger helt nya möjligheter i höstspannmål

Allmän information

Användningsområde

Mot ogräs i odlingar av höstvet, höstråg, höstrågvete och höstkorn

Registreringsnummer 6050

Verksam beståndsdel Akonifen 600 g/l (50 vikt-%)

Behörighetsklass 2

Klassificering/märkning Varning/ GHS07; H317/ GHS08; H351/ GHS09; H410. Se sida 120

Förpackning 5 l

Lagring Torrt och frostfritt i originalförpackning

UPMA -

Registreringsinnehavare Globachem N.V.



Verkningsätt

Chanon bekämpar ört- och gräsogräs i höstspannmål efter sådd. Den verksamma substansen akonifen tas upp i de ovanjordiska delarna av plantorna. Behandlade ogräs visar symptom på kloros, avstannad tillväxt och slutligen dör de.

Den aktiva substansen akonifen binds mycket hårt till jordpartiklar och stannar därför i markytan. Chanon är i huvudsak kontaktverkande och tas till största delen upp via skotten från groende ogräs.

Då behandling utförs strax efter ogräsen uppkomst kan Chanon också tas upp via bladen.

Användning

Höstvet, höstråg, höstrågvete och höstkorn

Tidpunkt Behandling med Chanon görs före uppkomst. BBCH 00–08.

Maxdos höstvet 1,35 l/ha

Maxdos höstkorn, höstrågvete och höstråg 1,0 l/ha

Max antal behandlingar 1 per gröda

Chanon har effekt på en bred ogräsflora som t ex våtarv, vallmo, åkerven och vitgröe. I strategier med fler ogräsprodukter förstärks effekter och ogrässpektrat breddas.

Kontakta Nordisk Alkali för frågor kring strategier och tankblandningar.

Jordartens betydelse

En fin såbädd och god tillväxt ger optimala verkningsbetingelser. Effekten påverkas mycket lite av markfukten. Ler och mull binder en större mängd av preparatet, sand och grus en mindre. Både ogräsen och grödans upptag av preparatet blir därför större på lättare jordar. På jordar med hög mullhalt ger behandling på uppkomna ogräs bäst effekt.

Rekommenderad vattenmängd är 200–300 l/ha.

Avrinning i kuperad terräng kan påverka känsliga grödor.

Vädrets betydelse

Chanon är effektivt även vid lägre temperaturer och lite torrare förhållanden. Höga temperaturer kan förbättra effekten.

Produktmässiga begränsningar

Rekommendationer

- Eftersträva jämn och fin såbädd, vältning före behandling rekommenderas. Vältning eller annan jordbearbetning efter behandling försämrar effekten väsentligt.
- Väl myllat utsäde, sådjup minst 3 cm
- Skölj sprutan vid avslut av dagens behandlingar, använd grova filter.
- Med fördel kan pH-opti eller liknande vattenkvalitetsprodukt användas.
- Rågvete och korn är känsligare än vete vid strategier. Råg är känsligast och försiktighet ska iaktas vid ev. strategier med fler produkter.

Skador av Chanon kan uppstå om behandling sker:

Strax före period med kraftiga regn- i synnerhet på lätt jord

Strax före nattfrost

Av en gröda som lider av stress p g a torka, vattenskada, sjukdom, näringsbrist m m

Efterföljande gröda

Valfri gröda kan etableras efter att jorden bearbetats.

Vid omsädd Lök, vete, korn och sojaböna kan odlas efter en djupare kultivering (20 cm).

Tillredning av sprutvätska

Grövre filter på växtskyddssprutan är att rekommendera. Skaka behållaren med Chanon väl innan användning.

Fyll tanken med 2/3 av den planerade vattenmängden. Tillsätt korrekt mängd Chanon till tanken under omrörning.

Chanon bör vara fullständigt uppblandad innan nästa produkt tillsätts. Fyll på resterande mängd vatten. Sprutvätskan ska vara under kontinuerlig omrörning under transport och spridning. Rengör tom dunkar noggrant och använd sköljvattnet i tankmixen.

Rengöring av sprututrustning

Efter avslutad sprutning vid dagens slut, sköljs sprutan grundligt med rent vatten, sköljvattnet kan ev. sprutas över den gröda som just sprutats. Glöm inte att rengöra utrustningen utvändigt.

1. Fyll sprutan med vatten. Tillsätt ett tankrengöringsmedel t ex All Clear Extra enl. rekommendation, spola genom slangar och bom. Töm sprutan genom bom/spridare, skölj tank/bom med rent vatten.
2. Spridare, silar och filter rengörs separat med samma rengöringsmedel och koncentration som användes till sprutan.
3. Skölj sprutan med vatten grundligt samtidigt med att sköljvattnet sprutas ut genom bom/spridare. Sköljvattnet sprids på arealer, där det inte kan förorena vattendrag, brunnar eller avloppsledningar.

Ytterligare villkor för användning

Skyddshandskar, skyddskläder och ansiktsskydd ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken ska utrustning som reducerar avdriften med minst 50 % användas.

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom"

När avdriftsreducerande utrustning krävs ska skyddsavståndet i hjälpredan läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.

Produkten ska skakas före användning.

Användningsvillkor Chanon

Gröda	Syfte	Behandlingsutrustning/metod	Utvecklingsstadium/säsong (min-max)	Max antal behandlingar/år	Behandlingsintervall (dagar)	Karenstid (dagar)	Max dos vid varje behandling	Kommentar
Höstvete, höstråg, höstrågvete och höstkorn	Mot ogräs	Bomspruta	BBCH 00-08 Endast höstbehandling	1	-	-	1,35 l/ha	

