

# Tripali®


Ogräsmedel

Ett nytt bredverkande ogräsmedel

**Mot örtogräs i odlingar av vete, havre, korn, råg och rågvete.  
Endast för vårbehandling.**

|               |                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Verksamt ämne | 83 g/kg metsulfuronmetyl<br>83 g/kg tribenuronmetyl<br>105 g/kg florasulam |
| Formulering   | Vattendispergerbart granulat (WG)                                          |
| Förpackning   | 250 g                                                                      |
| Dos           | 25-50 g/ha                                                                 |


*Tripali® kombinerar tre aktiva substanser som absorberas av växten genom bladen och rötterna, vilket möjliggör en optimerad penetration oavsett miljöförhållandena.*



## Rekommenderad användning

| Gröda                          | BBCH  | Max antal behandlingar | Max dos per behandling | Anmärkning                                                 |
|--------------------------------|-------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Höstsäd:<br>Vete, råg, rågvete | 23-39 | 1                      | 50 g/ha                | Endast vårbehandling.<br>Använd icke-jonisk vätmedel 0,05% |
| Höstsäd:<br>Korn               | 23-30 | 1                      | 50 g/ha                | Endast vårbehandling.<br>Använd icke-jonisk vätmedel 0,05% |
| Vårsäd:<br>Vete, korn          | 13-39 | 1                      | 50 g/ha                | Använd icke-jonisk vätmedel 0,05%                          |
| Vårsäd:<br>Havre               | 13-30 | 1                      | 25 g/ha                | Använd icke-jonisk vätmedel 0,05%                          |

| Rekommendation Tistel           | Effekt % |
|---------------------------------|----------|
| 50 gram Tripali                 | 70 - 90  |
| 35 gram Tripali +<br>1,0 l MCPA | 90       |



**ANVÄND VÄXTSKYDDSMEDEL MED FÖRSIKTIGHET. LÄS ALLTID ETIKETT OCH PRODUKT-  
INFORMATION FÖRE ANVÄNDNING. OBSERVERA ALLA VARNINGSTEXTER OCH SYMBOLER.**

# Tripali®

## Enastående bekämpning av örtogräs

### Ogräsmedel

Tripali® is trademark of FMC Corporation or an affiliate.

| Ogräseffekter Tripali® 50 g (källa: Jordbruksverket) |        |         |         |         |
|------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|
|                                                      | Vårsäd |         | Höstsäd |         |
| Ogräs/Effekt                                         | > 90%  | 70-90 % | > 90 %  | 70-90 % |
| Baldersbrå                                           | x      |         | x       |         |
| Blåklint                                             | x      |         | x       |         |
| Dån                                                  | x      |         | x       |         |
| Förgätmigej                                          | x      |         | x       |         |
| Gullkrage                                            |        | x       |         | -       |
| Jordrök                                              |        | x       |         | -       |
| Lomme                                                | x      |         | x       |         |
| Målla                                                | x      |         |         | -       |
| Penningört                                           | x      |         | x       |         |
| Pilört                                               | x      |         | x       |         |
| Plister                                              | x      |         | x       |         |
| Snärjmåra                                            | x      |         | x       |         |
| Spillraps                                            | x      |         |         |         |
| Trampört                                             |        | x       |         | x       |
| Vallmo                                               |        | -       | x       |         |
| Veronika                                             |        | x       |         | x       |
| Viol                                                 | x      |         |         | x       |
| Våtarv                                               | x      |         | x       |         |
| Åkerbinda                                            | x      |         | x       |         |
| Åkersenap                                            | x      |         |         | -       |
| Åkerspergel                                          | x      |         |         | -       |
| Åkertistel                                           |        | x       |         | -       |

### Övrig info

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Temperatur          | Över 5 °C                         |
| Regnfasthet         | För optimal effekt, 1-2 timmar    |
| Verkningsätt        | Bladverkan, jordverkan, systemisk |
| Duschkavlitet       | Fin-medium                        |
| Registreringsnummer | 5346                              |
| Behörighetsklass    | 2L                                |
| Lagring             | Frostfrit                         |
| Förpackning         | 250 g                             |
| Tillverkare         | FMC                               |

### Omsådd

En månad efter behandling ska man endast så vårvete med föregående plöjning innan sådd sker.

### Efterföljande grödor

Vid normal växtföljd kan man så följande grödor efter behandling med Tripali®:

Inom tre månader efter behandling med Tripali® kan stråsäd utan insådd säs, men se följande restriktioner.

- Vid behandling med max 35 g/ha Tripali® kan du efter två månader så spannmål med eller utan insådd av gräs/klöver och höstraps\*.

- Vid behandling med max 50 g/ha Tripali® kan du efter tre månader så spannmål med eller utan insådd av gräs/klöver och höstraps\*.

Våren efter kan man så spannmål med eller utan insådd av gräs/klöver, våroljeväxter, potatis\*, ärtor, åkerbönor, majs och lin.

Sockerbetor\* kan säs våren efter behandling med max 35 g/ha av Tripali® året innan.

I brist på tillräcklig information rekommenderas inte att odla grönsaker, blommor, prydnadsväxter, lökar, buskar eller träd året efter det att man har behandlat med Tripali®.

Om Tripali® används i blandning med en annan produkt läs alltid blandningspartners etikett och kontakta din representant för råd. Var särskilt uppmärksam vid tankblandning med andra produkter som helt eller delvis innehåller samma verksamma ämnen.

\*) På jordar med 50% sand och pH>8, kan det uppstå gulfärgning av sockerbetor, höstraps och potatis.

## Omsådd och efterföljande grödor

Tripali® har en viss jordverkande effekt beroende på dosen, markens pH, organiskt material i marken, tid efter behandling, växtodlingsmetoder och miljöförhållanden. Följ därför följande rekommendationer: