



syngenta®

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av potatis och sallat på friland samt tomat i växthus.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

Läs alltid etikett och bruksanvisning noggrant före användning.



Reg nr 4843. Behörighetsklass 2L.

Endast för yrkesmässigt bruk.

Riskupplysningar och skyddsanvisningar

Förvaras oåtkomligt för barn (S2).

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder (S13).

För att undvika risker för människor och miljö, följ bruksanvisningen.

Verksam beståndsdel: Mandipropamid 250 g/l (23,3% w/w)

Första hjälpen: Se säkerhetsdatabladet punkt 4.

Tomemballage: Se bruksanvisningen punkt 6.

Net innehåll: 5 L

Syngenta Crop Protection A/S

Strandlodsvej 44, 2300 Köpenhamn S, Danmark.

Tel 0771-24 48 10



BRUKSANVISNING

01 PRODUKTFAKTA

Verksam beståndsdel	Mandipropamid 250 g/l (23,3% w/w)
Formulering	Flytande
Behörighetsklass	2L
Förpackning	4 x 5 L
Lagring	Frostfritt

02 GODKÄND ANVÄNDNING

Mot svampangrepp i odlingar av potatis och sallat på friland samt tomat i växthus.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

03 BEHANDLINGSTIDER OCH RESTRIKTIONER

Behandling i potatis får inte ske senare än 3 dagar före skörd.
Behandling i sallat får inte ske senare än 7 dagar före skörd.
Behandling i tomat får inte ske senare än 3 dagar före skörd.

Skyddsavstånd

För att begränsa riskerna för vattenlevande organismer ska de anvisningar iakttas som framgår av Naturvårdsverkets allmänna råd 97:3 och de hjälpredor för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd som tillhör Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel.

04 VERKNINGSSÄTT OCH VERKNINGSMEKANISM

En stor andel av Revus® tas upp i bladens vaxlager efter behandling, vilket medför en god regnfasthet så snart sprutvätskan har torkat på bladen. Revus® fungerar förebyggande och är mycket verksamt mot groning av sporer. Den aktiva substansen tränger in i bladen och ger därför en bra translaminär effekt. Revus® hämmar myceltillväxt under inkubationstiden. Den aktiva substansen inhiberar cellulose syntesen hos Oomycete svampar. Revus® är mycket verksamt mot sjukdomar i svampgruppen Oomycetes, som t.ex. potatisbladmögel (*Phytophthora infestans*).

Resistens

För att förhindra att resistens uppstår, bör inte mer än ½ av alla fungicidbehandlingar utföras med Revus® eller andra fungicider med samma verkningsätt.

05 GRÖDOR, DOSERING OCH BEHANDLINGSTIDPUNKT

Revus® rekommenderas för förebyggande behandling av bladmögel (*Phytophthora infestans*) i potatis och tomat, och sallatsbladmögel (*Bremia lactucae*).

GRÖDA	SKADEGÖRARE	DOSERING (l/ha)	ANMÄRKNING
Potatis	Potatisbladmögel	0,6	Första behandlingen utförs när risken för angrepp är hög. Behandla med 0,6 l/ha med 7 dagars intervall. Behandling får ej ske senare än 3 dagar före skörd. Revus® får utgöra max. 50% av behandlingarna eller max. 6 behandlingar per säsong.
Tomat i växthus	Bladmögel	0,6	Första behandlingen utförs när risken för angrepp är hög. Behandla med 0,6 l/ha med 7 dagars intervall. Behandling får ej ske senare än 3 dagar före skörd. Max. 4 behandlingar per säsong.
Sallat på friland	Sallatsbladmögel	0,6	Första behandlingen utförs när risken för angrepp är hög. Behandla med 0,6 l/ha med 7 dagars intervall. Behandling får ej ske senare än 7 dagar före skörd. Max. 2 behandlingar per säsong.

06 BEHANDLINGSTEKNIK, RENGÖRING MM

Revus® kan appliceras med hjälp av traktorspruta eller ryggspruta. En god och jämn täckning av grödan säkerställer en god effekt.

Vattenmängd (l/ha)

Potatis 150-300
Tomat 500-2000
Sallat 200-500

Beredning av sprutvätskan

Blanda inte mer sprutvätska än vad som åtgår vid behandlingen. Fyll tanken till hälften med vatten. Tillsätt preparaten var för sig och resten av vattnet under omrörning. Sprutvätskan ska vara under kontinuerlig omrörning under transport och sprutningsarbete. Använd alltid skyddsutrustning vid hantering av koncentrerat preparat och sprutvätska. Koncentrerat preparat eller sprutvätska får under inga omständigheter komma ut i avlopp, åar eller vattentäktar.

Rengöring av sprututrustning

1. Rengör sprututrustningen ut- och invändigt omedelbart efter användning med rent vatten i fält.
 2. Skölj tanken invändigt med rent vatten och medel avsett för rengöring av sprututrustning, t ex All Clear™ Extra. Spruta ut sköljvattnet i fält. Läs produktens bruksanvisning före användning.
 3. Skölj sprututrustningen med vatten och medel avsett för rengöring av sprututrustning. Slangar, munstycken, ventiler och filter skall genomsköljas och tanken skall stå under omrörning i minst 25 minuter. Filter och munstycken rengörs också separat i vatten tillsatt medel avsett för rengöring av sprututrustning.
- Denna rengöring bör ske på säker plats, t ex biobädd eller behandlad mark/gröda. Sköljvatten får under inga omständigheter förorena avlopp, brunnar, åar, dammar etc.

Avfall och tomemballage

Förpackningar ska sköljas omsorgsfullt (minst tre gånger) med vatten som hålls i sprut-tanken och används vid behandlingen. Låt förpackningen rinna av, upp och ned under minst 30 sekunder. Rengjorda förpackningar lämnas till SvegReturs insamlingsplatser enligt information på www.svepretur.se. Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel lämnas för materialåtervinning vid kommunens återvinningscentral. Syngenta är anslutet till SvegRetur tel 0370-173 85 samt till REPA tel 0200-88 03 10. Preparatrest, sköljvatten och ej rengjorda förpackningar är farligt avfall och lämnas för destruktion. Kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning.

07 OPTIMALA VERKNINGSFÖRHÅLLANDEN

Fytotoxitet

Revus® är mycket selektivt i alla grödor den rekommenderas för. Före användning i stor skala i grödor under plast eller glas, utförs ett test på några få plantor. Här skall hänsyn också tas till sorter, växtvillkor och när på året behandling utförs (växthus).

IPM

Revus® är ofarligt för nyttoinsekter och honungsbin.

08 TANKBLANDNING

Med våra nuvarande kunskaper är Revus® fysikaliskt blandbar med de viktigaste svamp-, insekt-, ogräs- och stråförkortningspreparaten samt mikronäringsämnen av god kvalitet. Fysikaliskt blandbar innebär att ingen utfällning sker. Olika faktorer såsom vattenkvalitet, temperatur, vattnets hårdhet mm kan inverka på blandningen. Gör därför alltid en provblandning först. Läs alltid respektive preparats etikett före användning.

09 OMSÅDD; EFTERFÖLJANDE GRÖDOR

Inga restriktioner.

10 ATT BEAKTA

Syngenta är ansvarig för att produkten har den sammansättning, som är anmäld till myndigheterna, såvida den finns i originalförpackning, lagras och används enligt etikett. Syngenta fråntar sig allt ansvar för produktens effekt samt skador, även följdskador, som uppstått genom felaktig lagring och användningssätt. Var uppmärksam på att faktorer såsom väder, markförhållanden, sorter, resistens, behandlingsteknik kan påverka produktens effekt.

För mer information om produkten se vår hemsida www.syngenta.se

Registrerede varemærker

Syngenta Group Company: Revus®