Piggfor

Omega X E1200

Omega X E1200 är ett koncentrat som tillsammans med spannmål ger ett enhetsfoder till suggor.

Omega X E1200 är ett koncentrat som tillsammans med spannmål ger ett enhetsfoder till suggor. Säkra grunden för ett bra produktionsresultat genom att analysera gårdens spannmål och låt din Piggforsäljare optimera ett foderrecept. Rekommenderad inblandning av Omega X E1200 i torrfoder är ca 18%.

Grundgivan för en dräktig sugga är ca 25 MJ per dag. Extra tillägg för hullkompensering till suggor som tappat i kondition under digivningen bör ges, totalt ca 35 MJ/dag under de första 40 dagarna av dräktigheten. Vintertid behövs ”köldtillägg” med 2,5 MJ/dag per 5 grader om stalltemperaturen understiger 15 grader. Fodergivan ökas successivt från dagen efter grisning så att full giva (21 MJ+5,6 MJ NE/smågris) nås på 7-10 dagar.

Observera att detta är en generell näringsdeklaration. För aktuell information hänvisas till deklaration på följesedel respektive säcketikett.

Specifikation:

Artikelnr: 407518

Näringsinnehåll	
Vattenhalt, %	10
Råprotein g/kg	266
Råfett, g/kg	41
NEsugg, MJ/kg	6.7
OE beräknad, MJ/kg	8.9
Lysin g/kg	28.3
Metionin g/kg	5.8
Kalcium, g/kg	38
Natrium g/kg	12
Växttråd g/kg	87
Aska, g/kg	187

Tillsatser	
Selen mg/kg	2.4
Vitamin A, IE/kg	46300
Vitamin D, totalt IE/kg	9930
Vitamin D från HyD IE/kg	1800
Vitamin D3, IE/kg	8130
Vitamin E, mg/kg	840

Beräknad klimatpåv. I kg CO2-ekv per ton foder	
Totalt	560
varav LU/LUC	83,9
varav org. jordar	27,7

Klimat och miljö	
Fosfor P, g/kg	14
Kalium K, g/kg	10
Kväve N, g/kg	43

Piggfor

Omega X E1200

Beräknad klimatpåverkan

Fodrets klimatpåverkan har beräknats enligt riktlinjer från RKFS (Regler för beräkning och kommunikation av klimatpåverkan för Foder i Sverige).
Klimatpåverkan för transport från fabrik till kund är beräknat till 6g CO2ekv/kg foder.

Tillverkas av

Lantmännen Lantbruk, 205 03 Malmö, Telefonnummer: 0771-111 222

Utförande Pelletskross

Produkten tillverkas som pelletskross. **HÅLLBARHET**: bör förbrukas inom 4 månader från tillverkningsdatum. Fodret ska förvaras torrt.