teppeki®

INSEKTICID

Nettoinnehåll:
2kg

Förvaras frostfritt

Batchnr. och produktionsdatum: Se förpackningen.

Tom förpackning får inte återanvändas.

Registreringsinnehavare:

ISK Biosciences Europe NV
Pegasus Park,
De Kleetlaan 12B,
1831 Diegem, Belgien
Tel: 32/2/627.86.11

® Registrerat varumärke för Ishihara Sangyo Kaisha Ltd., Japan

Användningsområde: Mot insektsangrepp i odlingar av vete, speltvete, korn, havre, råg och rågvete. Mot bladlöss i odlingar av potatis. Mot insektsangrepp i odlingar av äpple och päron. Mot insektsangrepp i odlingar av färska ärter utan skida/balja. Mot ärtbladlus och bönbladlus i odlingar av ärter och bönor, färska med balja. Mot ärtbladlus och bönbladlus i odlingar av ärter, bönor och linser för torkning. Mot bönbladlus och persikobladlus i odlingar av sockerbetor och foderbetor.

Reg.nr. 5847
Behörighetsklass 2L
Endast för yrkesmässig användning

Innehåll: Produkten är ett vattendispergerbart granulat (WG) innehållande 500 g/kg (50 vikt-%) flonicamid

GRUPP	29	INSEKTICID

12030301_2443 • 109046102:SE • 7-3320-666-214-14/25 • NA0824

Nordisk Alkali
GROWING TOGETHER
Krusegatan 19A, 212 25 Malmö
Tel 040 680 85 30 • info@nordiskalkali.se • www.nordiskalkali.se

Teppeki®
UFI: 62J6-F9FJ-6X8Y-WK8U

Varning



H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
EUH208 Innehåller natriummaleat. Kan orsaka en allergisk reaktion
EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
SPe 8 Farligt för bin.
P280 Använd ögonskydd/ ansiktsskydd.
P501 Innehållet och behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare.
SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/ Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.)

Första hjälpen
P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.
För mer information se säkerhetsdatablad.

EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Nordisk Alkali GROWING TOGETHER

Bruksanvisning
Teppeki användes mot bladlöss i stråsäd, potatis, äpplen och päron, sockerbetor och foderbetor, ärter, bönor och linser.

Verkningssätt
Teppeki är systemisk verkande, då den aktiva substansen transporteras uppåt och utåt i plantan. Medlet verkar också genom att tränga genom bladen (translaminär verkan), så det ger möjligheter att bekämpa gömda bladlöss. Effekterna påverkas inte av höga eller låga temperaturer.

Teppeki stoppar födointaget efter några få timmar, varefter skadedjuren svälter ihjäl efter några dagar. Effekten syns efter 4-6 dagar. Det är ingen egentlig knowdown effekt, men skadeverkningen upphör omedelbart. Effekten verkar upp till 3 veckor vid full dos.

Gröda	Insekt	Dosering	Sprutintervall	Utvecklingsstadier	Observera
Äpple, Päron	Grön (Aphis pomi) och röd äpple-bladlus (Dysaphis plantaginea), Röd päronbladlus (Dysaphis pyri)	140 g/ha i 200-1000 l/ha vatten	3 veckors intervall (minst 21 dagar). Maximalt 3 behandlingar per år.	Vid begynnande angrepp före blomningen (BBCH 51-59) och efter blomningen (BBCH 71-75).	Vattenmängden är beroende av trädstorlek, täthet och sprututrustning. Karenstid 21 dagar före skörd

Nordisk Alkali
GROWING TOGETHER

Gröda	Insekt	Dosering	Sprutintervall	Utvecklingsstadier	Observera
Potatis	De flesta arter av bladlöss såsom Persikbladlus (Myzus persicae); getapelbladlus (Aphis nasturtii); potatisbladlus (Macrosiphum euphorbiae); brakvedbladlus (Aphis frangulae)	160 g/ha i 200-500 l/ha vatten	Maximalt 1 behandling per år.	Från 8e sidoskottet, från basen, synligt (BBCH 28) fram till första individuella knopparna (1-2 mm) synliga i första blomställningen (BBCH 51).	Vattenmängden är beroende av bladmassan. Följ rekommenderade tröskelvärden. Vid spridning får olja inte tillsättas i tankblandningen.

Nordisk Alkali
GROWING TOGETHER

Gröda	Insekt	Dosering	Sprutintervall	Utvecklingsstadier	Observera
Höstvete, vårvete, speltvete, råg och rågvete	De flesta arter av bladlöss såsom sädesbladlus (Macrosiphum avenae); grönstrim-miggräsbladlus (Metopolophium); havrebladlus (Rho-palosiphum padi)	100-140 g/ha i 150-300 l/ha vatten	3 veckors intervall (minst 21 dagar). Verkningstid nor-malt 3 veckor, vid behov behandla/ spruta igen. Max 2 behan-dlingar per år.	Från huvudskott och ett sidoskott (BBCH 21) fram till sent mjölkmognads stadie (BBCH 77). Endast vårbehandling.	Den lägre dosen endast under optimala betin-gelser. Följ rekom-menderade tröskelvärden. Endast vårbehan-dling. Effekt mot lågt sittande lus är osäker

Nordisk Alkali
GROWING TOGETHER

Gröda	Insekt	Dosering	Sprutintervall	Utvecklingsstadier	Observera
Höstkorn, vårkorn och havre	De flesta arter av bladlöss såsom sädesbladlus (Macrosiphum avenae); grönstrim-miggräsbladlus (Metopolophium); havrebladlus (Rho-palosiphum padi)	100-140 g/ha i 150-300 l/ha vatten	Max 1 behandling per år.	Från huvudskott och ett sidoskott (BBCH 21) fram till sent mjölkmognads stadie (BBCH 77). Endast vårbehandling.	Den lägre dosen endast under optimala betingelser. Följ rekommenderade tröskelvärden. Endast vårbehan-dling. Effekt mot lågt sittande lus är osäker
Färska ärter utan skida/ balja	De flesta arter av bladlöss såsom ärtbladlus (Acyrtho-siphon pisum); bönbladlus (Aphis fabae); persikblad-lus (Myzus persicae)	140 g/ha i 200-400 l/ha vatten	Max 1 behandling per år.	Vid angrepp: från att ärtplantan har 6 klängen (BBCH 16) till 10 % av baljorna har nått full längd (BBCH 71).	Karenstid 14 da-gar före skörd. Ska ej användas tillsammans med olja eller vätmedel.*

Nordisk Alkali
GROWING TOGETHER

Gröda	Insekt	Dosering	Sprutintervall	Utvecklingsstadier	Observera
Ärter och bönor, färska med balja	Ärtbladlus (Acyrthosiphon pisum); bönbladlus (Aphis fabae)	140 g/ha i 200-400 l/ha vatten	Max 1 behandling per år.	Vid angrepp: från första bladet utvecklat (BBCH 11) till 10 % av baljorna har nått full längd (BBCH 71).	Karenstid 14 dagar före skörd. Olja eller vätmedel kan tillsättas för bättre spridning.
Ärtor, bönor och linser, för torkning	Ärtbladlus (Acyrthosiphon pisum); Bönbladlus (Aphis fabae)	140 g/ha i 200-600 l/ha vatten	Max 1 behandling per år.	Vid angrepp: från första bladet utvecklat (BBCH 11) till 10 % av baljorna har nått full längd (BBCH 71).	Ska ej användas tillsammans med olja eller vätmedel.*
Sockerbetor och foderbetor	Betbladlus (Aphis fabae); persikbladlus (Myzus persicae)	140 g/ha i 200-600 l/ha vatten. Optimal vattenvolym 300 l/ha	Max 1 behandling per år.	Vid angrepp: från att sockerbetan har 6 örtblad (BBCH 16) till skörd (BBCH 49).	Karenstid 60 dagar före skörd.

** För att optimera effekten av Teppeki är det viktigt att använda vätskemängd och munstycke som ger god täckning på plantan. Det är viktigt att inte använda vätskemängder mindre än 200 l vatten/ha.*

Nordisk Alkali
GROWING TOGETHER

Ytterligare villkor
Åtgärder för skydd av bin och andra pollinerande insekter: Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda.
Personlig skyddsutrustning: Ögonskydd ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Tillredning av sprutvätska
Fyll upp sprutan till hälften med vatten och tillsätt uträknad mängd Teppeki. Fyll sedan upp sprutan till beräknad volym. Omröring igång under hela tiden till produkten är utsprutad

Resistens
Överskrid inte det maximala antalet behandlingar. Efter maximalt 2 behandlingar med Teppeki i rad (i höstvete, päron och äpple), bör efterföljande behandlingar vara med produkter från en annan kemisk familj för att undvika att behandla flera generationer av skadedjur med produkter med samma verkningssätt. Effekten av en behandling varar i 14 till 21 dagar och maximalt 1-3 behandlingar (beroende på växtslag) är tillåtet.

Mindre användningsområde (UPMA)
Teppeki är godkänt att använda i:
* Mot insektsangrepp i odlingar av morötter.
* Mot insektsangrepp i odlingar av vitkål, rödkål, spetskål, savojkål och brysselkål på friland.
* Mot insektsangrepp i utsädesodlingar av ärter, bönor, spenat, rättika, gräslök, persilja, timjan, prydnadsväxter och tvååriga Brassicaväxter (inklusive Pak Choy) på friland.
* Mot insektsangrepp i odlingar av tomat, aubergine och gurka i tunnel och växthus.
* Mot insektsangrepp i odlingar av prydnadsväxter, plantskoleväxter och skogsplantor på friland, i tunnel och växthus.

För vidare information gå in på Kemikalieinspektionens hemsida (www.kemi.se) för att se doseringar, tidpunkter, antal behandlingar och ytterligare villkor.

Nordisk Alkali
GROWING TOGETHER

Innehavaren av produktgodkännandet har inget ansvar för eventuella skador på grödan eller uteblivna effekter vid användning av produkten enligt användningsområdet i ett UPMA-beslut.
Det är användaren av produkten som själv bär ansvaret vid användning enligt det utvidgade användningsområdet.

Rengöring av spruta
Sprutan sköljs med vatten 3 gånger och sköljvattnet sprutas ut på den behandlade arealen. Rengör ej sprutan i närheten av sjö eller vattendrag.

Lagring av produkt
Torrt, svalt och frostfritt i väl tillsluten originalförpackning.

Avfallshantering
Tom förpackning får inte återanvändas. De tomma förpackningarna ska sköljas ordentligt med vatten minst tre gånger och ställas upp och ned minst 30 sekunder för avrinning. Sköljvattnet häller man i sprutan och sprutar ut på fältet. Väl rengjorda och torra plastförpackningar med avtagen skruvkork ska lämnas för energiutvinning till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar. Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel lämnas för materialåtervinning vid kommunens återvinningscentral. Företaget är anslutet till SvepRetur (www.svepretur.se). Ej rengjord förpackning och ev. rester av produkten lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Observera
Detta medel är prövat i svenska försök. Anvisningarna grundar sig på resultaten från dessa. Då användningen ligger utanför vår kontroll och vi ej kan förutse alla de omständigheter som kan påverka resultatet i det enskilda fallet, kan vi ej påtaga oss något ansvar för eventuella skadeverkningar.
Nytt sortmaterial, förändrad odlingsteknik eller uppkommen resistens kan resultera i att preparatet inte ger önskad effekt eller till och med att skador uppstår på grödan. Tillverkaren ansvarar ej för uppkommen skada på grund av sådana förhållanden eller liknande omständigheter, vilka ej kunnat förutses vid preparatets saluförande. Tillverkaren garanterar för varans kvalitet och jämnhet samt att medlet, under normala förhållanden, är ägnat åt de i bruksanvisningen angivna ändamålen. Tillverkaren fråntar sig däremot allt ansvar för möjliga skador, otillräcklig eller utebliven effekt som har uppstått i förbindelse med köparens inkorrekta lagring, transport, hantering och användning av produkten. Följ alltid anvisningarna för säkert växtskydd.

Nordisk Alkali
GROWING TOGETHER

teppeki®

INSEKTICID

Nettoinnehåll:
2kg

Förvaras frostfritt

Batchnr. och produktionsdatum: Se förpackningen.

Tom förpackning får inte återanvändas.

Registreringsinnehavare:

ISK Biosciences Europe NV
Pegasus Park,
De Kleetlaan 12B,
1831 Diegem, Belgien
Tel: 32/2/627.86.11

® Registrerat varumärke för Ishihara Sangyo Kaisha Ltd., Japan

Användningsområde: Mot insektsangrepp i odlingar av vete, speltvete, korn, havre, råg och rågvete. Mot bladlöss i odlingar av potatis. Mot insektsangrepp i odlingar av äpple och päron. Mot insektsangrepp i odlingar av färska ärter utan skida/balja. Mot ärtbladlus och bönbladlus i odlingar av ärter och bönor, färska med balja. Mot ärtbladlus och bönbladlus i odlingar av ärter, bönor och linser för torkning. Mot bönbladlus och persikobladlus i odlingar av sockerbetor och foderbetor.

Reg.nr. 5847
Behörighetsklass 2L
Endast för yrkesmässig användning

Innehåll: Produkten är ett vattendispergerbart granulat (WG) innehållande 500 g/kg (50 vikt-%) flonicamid

GRUPP	29	INSEKTICID

12030301_2443 • 109046102:SE • 7-3320-666-214-14/25 • NA0824

Nordisk Alkali
GROWING TOGETHER
Krusegatan 19A, 212 25 Malmö
Tel 040 680 85 30 • info@nordiskalkali.se • www.nordiskalkali.se

Teppeki®
UFI: 62J6-F9FJ-6X8Y-WK8U

Varning



H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
EUH208 Innehåller natriummaleat. Kan orsaka en allergisk reaktion
EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
SPe 8 Farligt för bin.
P280 Använd ögonskydd/ ansiktsskydd.
P501 Innehållet och behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare.
SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/ Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.)

Första hjälpen
P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.
För mer information se säkerhetsdatablad.

EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Nordisk Alkali GROWING TOGETHER