novagib®

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
MOT KORKROSTBILDNING I ODLINGAR AV ÄPPLE. FÖR SKALFÖRBÄTTRING I ODLINGAR AV ÄPPLE. FÖR FÖRBÄTTRAD FRUKTSÄTTNING I ODLINGAR AV PÄRON.

INNEHÅLL: ETT VATTENLÖSLIGT KONCENTRAT INNEHÅLLANDE 10 G/L GIBBERELLINER (GA4/7)

REG NR: 5679

BEKÄMPNINGSMEDEL: KLASS 2L
ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

EUH401: För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
SP1: Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

FÖRVARAS I ORIGINALFÖRPACKNING OCH FROSTFRITT

LÄS MEDFÖLJANDE ANVISNINGAR FÖRE ANVÄNDNING

TOM FÖRPACKNING FÅR EJ ÅTERANVÄNDAS.

Nordisk Alkali

Satsnummer och tillverkningsdatum: Se förpackningen.
Sista förbrukningsdag: 2 år efter tillverkningsdatum

REGISTRERINGSINNEHAVARE OCH ® REG. VARUMÄRKE
fine

FINE AGROCHEMICALS LIMITED
HILL END HOUSE WHITTINGTON
WORCESTER WR5 2RQ
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
ENQUIRE@FINE.EU TEL: +44 1905361800

Nordisk Alkali
GROWING TOGETHER

DISTRIBUERAS AV:
NORDISK ALKALI
KRUSEGATAN 19A
212 25 MALMÖ
TEL 040-680 85 30
E-POST INFO@NORDISKALKALI.SE

NETTOINNEHÅLL: 1L

NOV/SE/1L/23

BEHANDLING AV FRUKTSKALSKVALITET OCH KORKROSTBILDNING I ÄPPLE

Behandla med 0,25 - 0,5 liter **novagib®** per hektar i sen blomning till kronbladsfall (BBCH 69) följt av ytterligare tre behandlingar med intervallet 7-10 dagar fram till BBCH 74 (fruktstorlek upp till 40 mm) för att täcka riskperioden mot korkrost. Den maximala totala dosen är 2 L / ha / gröda. Max 4 behandlingar per år.

Använd högre doser och fler delbehandlingar (inom den maximalt tillåtna totala dosen och max antal behandlingar) när risken för korkrost är högre. Bästa effekten uppnås alltid genom att använda högre doser.

BEHANDLING FÖR FÖRBÄTTRAD FRUKTSÄTTNING I PÄRON

Applicera upp till 1,2 liter **novagib®** per hektar under blomningen från 20% öppna blommor fram tills kronbladen faller av (BBCH 62-69).
Det rekommenderas att använda produkten i en dos av 1,2 l / ha fram till slutet av blomningen, antingen som en behandling med upp till 1,2 l / ha eller med två behandlingar vardera på 0,6 l / ha, med ett tidsintervall mellan behandlingarna på 3 dagar. Då 2 behandlingar används ska behandlingarna utföras i full blom på 2-årig och 1-årig vedtillväxt.
Doserna bör anpassas till fruktodlingens specifika förhållande med hänsyn till sort, blomningsförhållanden och väderförhållanden. Tillgodose att odlingsmetoderna är anpassade för att klara av en högre fruktsättning.
För stor fruktsättning kan resultera i ett stort antal små frukter.
Följande päronsorter har testats: Conference, Abate Fetel, Doyenne du Comice och Williams.

I både äpplen och päron kan behandlad frukt få en tendens att bli något mer konisk och långsträckt.

Karenstid innan skörd: Ingen karenstid krävs

Tillredning av sprutvätska
Tillsätt under omrörning den beräknade mängden **novagib®** till den halvfyllda spruttanken. Fyll därefter på tanken med vatten och fortsätt omrörningen under sprutningen.

Behandla med en fruktträdspruta och använd en vattenvolym som är tillräcklig för att uppnå fullständig inträngning och täckning av träden, vanligtvis 300-1000 l / ha. Sprutning i stilla, fuktiga förhållanden kommer att öka effekten av **novagib®**. Lämna inte kvar sprutvätska i sprutan under långa perioder (dvs. under måltider eller över natten).

Skyddsutrustning:
Vid beredning: skyddshandskar
Vid besprutning: skyddshandskar (behövs inte i en stängd hytt)

Avfallshantering
Tom förpackning får inte återanvändas. De tomma förpackningarna ska sköljas ordentligt med vatten minst tre gånger och ställas upp och ned minst 30 sekunder för avrinning. Sköljvattnet häller man i sprutan och sprutar ut på fältet. Väl rengjorda och torra plastförpackningar med avtagen skruvkork ska lämnas för energiutvinning till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar. Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel lämnas för materialåtervinning vid kommunens återvinningscentral. Företaget är anslutet till SvepRetur (www.svepretur.se).
Ej rengjord förpackning och ev. rester av produkten lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Observera
Tillverkaren garanterar för varans kvalitet och jämnhet samt att medlet, under normala förhållanden, är ägnat åt de i bruksanvisningen angivna ändamålen. Tillverkaren frântar sig däremot allt ansvar för möjliga skador, otillräcklig eller utebliven effekt som har uppstått i förbindelse med köparens inkorrekta lagring, transport, hantering och användning av produkten. Följ alltid anvisningarna för säkert växtskydd.

BRUKSANVISNING

Användning av **novagib®** under fruktutvecklingen förbättrar kvaliteten och den säljbara andelen frukt genom att förekomsten och graden av korkrost avsevärt minskar samt ger en förbättrad skalyta och utseende på äpplet. Skalets elasticitet ökar eftersom celltillväxten stimuleras (morfologin i epidermis förändras hos den växande frukten), vilket resulterar i att effekten av **novagib®** på fruktens skalkvalitet uppnås.

Vid sen frost eller otillräcklig pollinering i päron, kan **novagib®** öka fruktsättningen vid applicering under blomningen. Effekten av **novagib®** på fruktsättningen uppnås genom att främja utvecklingen av partenokarp frukt (frukter utan frö/kärnor).

Rekommenderad dos

Novagib® innehåller gibberellin A4, en tillväxtreglerare som kommer från den jäsningsprocess som normalt sker i äpplen

kultur	max. antal behandlingar/år	Minst antal dagar mellan behandlingarna	Dos (l/ha)	Vatten (l/ha)	Tidpunkt för användning
Äpple	4	7	0,25-0,5	300-1000	Från kronbladen faller av till fruktstorlek upp till 40mm (BBCH 69-74)
Päron Alt. 1	2	3	0,6	300-1000	20% öppna blommor fram tills kronbladen faller av (BBCH 62-69)
Päron Alt. 2	1	–	1,2		Alternativ 1 och 2 i päron får ej kombineras – max 2 behandlingar/år samt total maxdos/år är 1,2 l/ha.

Nordisk Alkali
GROWING TOGETHER