Narita®

FUNGICID

Nettoinnehåll: 5L

Användningsområde: Mot torrfläcksjuka (*Alternaria spp.*) i odlingar av potatis.

Reg.nr. 5999
Behörighetsklass 2L.
Endast för yrkesmässigt bruk.

Läs medföljande anvisningar före användning

Innehåll: Produkten är ett emulgerbart koncentrat innehållande 250 g/l (23,6 vikt-%) difenokonazol. Innehåller även lacknafta (petroleum), tung aromatisk.

GRUPP	3	FUNGICID

Förvaras torrt och frostfritt.
Batchnummer och tillverkningsdatum: Se förpackningen.
Tom förpackning får inte återanvändas.

Registreringsinnehavare:

Globachem
Your Crop Counts

Globachem NV
Lichtenberglaan 2019
BE-3800 Sint-Truiden, Belgien.
www.globachem.com

® Narita är ett registrerat varumärke tillhörande Globachem NV

12230403_2549 • 107046117:SE • NA1225

Nordisk Alkali
GROWING TOGETHER

Nordisk Alkali AB
Krusegatan 19A, 212 25 Malmö
Sverige
Tel: 040 6808530
info@nordiskalkali.se

BRUKSANVISNING
Narita används till att bekämpa torrfläcksjuka, *Alternaria spp.*, i odling av potatis och används oftast ihop med preparat med effekt mot potatisbladmögel.

Riskhanteringsåtgärder
Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbrukssprutа med bom". De som ska arbeta med behandlade växtdelar ska informeras om produktens hälsorisker.

Resistens
Difenokonazol tillhör gruppen DMI-fungicider (FRAC grupp 3) som anses ha en medelhög risk för utveckling av resistens. Eftersom risken för resistensbildning är närvarande vid upprepad användning av samma aktiva substans, skall Narita användas växlande med andra preparat med annorlunda verkningsmekanismer.

Användning
Narita skall användas förebyggande. Första behandlingen utförs vid tecken på närstående sjukdomsutbrott eller när lokalt varningssystem anger hög risk för angrepp. Doseringen är baserad på att det även används andra effektiva preparat mot torrfläcksjuka i behandlingsprogrammet. Normalt används Narita i strategier med preparat mot potatisbladmögel.

Dosering

Sjukdom	Dosering och vattenmängd	Behandlingstidpunkt	Antal behandlingar och intervall
Torrfläcksjuka på potatis *Alternaria spp.*	0,4 l/ha i 150-400 l vatten	BBCH 40-91 (från att raderna sluter sig)	Max 3 behandlingar per år. 10-14 dagars intervall (min 10 dagar). karenstid 14 dagar.

Tillredning av sprutvätska
Fyll sprutan till hälften med vatten och starta omrörningen. Tillsätt därefter Narita. Fyll i den resterande vattenmängden. Sprutvätskan ska vara under kontinuerlig omrörning under transport och sprutningsarbete för att undvika risk för utfällning. Använd sprutblandningen genast. Narita kan användas med vanlig markspruta eller luftassisterad spruta.

Rengöring av sprutan
Eventuell rest skall spädas ut minst 50 gånger och sprutas ut på den behandlade arealen. Sprutan sköljs med vatten och rengöringsmedel flera gånger både utvändigt och invändigt efter användning och sköljvattnet sprutas ut på den behandlade arealen. Det är viktigt att man startar med en rengjord spruta, speciellt om sprutan även används i andra grödor än potatis. Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Rengör ej sprutan i närheten av sjö eller vattendrag.

Nordisk Alkali GROWING TOGETHER

Skyddsutrustning
Skyddshandskar, skyddskläder och ansiktsskydd ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Avfallshantering
Tom förpackning får inte återanvändas. De tomma förpackningarna ska sköljas ordentligt med vatten minst tre gånger och ställas upp och ned minst 30 sekunder för avrinning. Sköljvattnet häller man i sprutan och sprutar ut på fältet. Väl rengjorda och torra plastförpackningar med avtagen skruvkork ska lämnas för energiutvinning till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar. Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel lämnas för materialåtervinning vid kommunens återvinningscentral. Företaget är anslutet till SvepRetur (www.svepretur.se).
Ej rengjord förpackning och ev. rester av produkten lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Förvaring
Förvaras frostfritt i sluten originalförpackning med originaletikett.

Övrigt
Bruksanvisning och rekommendationer är baserade på omfattande försök och fleråriga erfarenheter. Nytt sortmaterial, förändrad odlingsteknik eller uppkommen resistens kan resultera i att preparatet inte ger önskad effekt eller till och med att skador uppstår på grödan. Tillverkaren ansvarar ej för uppkommen skada på grund av sådana förhållanden eller liknande omständigheter, vilka ej kunnat förutses vid preparatets saluförande.

Nordisk Alkali
GROWING TOGETHER

Nordisk Alkali
GROWING TOGETHER

Narita®

FUNGICID

Nettoinnehåll: 5L

Användningsområde: Mot torrfläcksjuka (*Alternaria spp.*) i odlingar av potatis.

Reg.nr. 5999
Behörighetsklass 2L.
Endast för yrkesmässigt bruk.

Läs medföljande anvisningar före användning

Innehåll: Produkten är ett emulgerbart koncentrat innehållande 250 g/l (23,6 vikt-%) difenokonazol. Innehåller även lacknafta (petroleum), tung aromatisk.

GRUPP	3	FUNGICID

Förvaras torrt och frostfritt.
Batchnummer och tillverkningsdatum: Se förpackningen.
Tom förpackning får inte återanvändas.

Registreringsinnehavare:

Globachem
Your Crop Counts

Globachem NV
Lichtenberglaan 2019
BE-3800 Sint-Truiden, Belgien.
www.globachem.com

® Narita är ett registrerat varumärke tillhörande Globachem NV

12230403_2549 • 107046117:SE • NA1225

Nordisk Alkali
GROWING TOGETHER

Nordisk Alkali AB
Krusegatan 19A, 212 25 Malmö
Sverige
Tel: 040 6808530
info@nordiskalkali.se