



Reg. nr. 6062 Behörighetsklass 2. Endast för yrkesmässigt bruk.

Innehåll: Produkten är en mikroemulsion (ME), innehållande MCPA 233 g/l (20.7% w/w) (MCPA (kaliumsalt 277,4 g/l), Fluroxipyr 50 g/l (4.4% w/w) (Fluroxipyr-1-metylhepylester 72 g/l), Klopyralid 28 g/l (2.5% w/w) (Klopyralid (monoetanolaminsalt) 36,9 g/l).

Läs medföljande anvisningar före användningen.

OMSKAKAS VÅL FÖRE ANVÄNDNING!

Lagras frostfritt!

Tom förpackning får inte återanvändas

GRUPP

4

HERBICID

Ett systemiskt, bladverkande ogräsmedel för bekämpning av örtogräs.

Användningsområden: Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, råg, rågveete och havre.
Mot örtogräs i odlingar av gräsfrvall, betesvall och slåttervall. Mot örtogräs i gräsmattor

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

P280 Använd ögonskydd/ ansiktsskydd.

P305+ P351+ P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsatt att skölja.

P337+ P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P391 Samla upp spill.

P501 Innehållet och behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare.

EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.


Vid nödsituation, ring SOS alarm 112 och begär giftinformation.

SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

SPe 1: För att skydda grundvatten, använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande klopyralid under det efterföljande året på samma fält när produkten har använts i odlingar av stråsäd i BBCH 21–29.

SPe 1: För att skydda grundvatten, använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande klopyralid under det efterföljande året på samma yta eller fält när produkten har använts för behandling av nyetablerad gräsmatta eller gräsvall i BBCH 30–40.

VARNING



UFI: CK5Q-Q13E-S00M-QATF

Registreringsinnehavare: Barclay Chemical R&D Ltd.,
Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddard, Dublin 15, Irland. Tel: +353 1 8112900

Marknadsföring och distribution: Nordisk Alkali AB
Krussegatan 19A, SE-212 25 Malmö, Sweden. Tel: +46 40 680 8530

Copyright © Barclay Chemicals R&D Limited 2026

© registrerat varumärke Barclay Chemical (R&D) Ltd, Irland

Produktionsdatum/Batch nr./ Net innehåll: Se på förpackning

Hållbarheten är begränsad och sista användningsdag är 2 år efter tillverkningsdatum

BRUKSANVISNING

Kinvara är ett ogräsmedel som bekämpar annuella och perenna bredbladiga ogräs i odlingar av vete, korn, råg, rågvete, havre samt i vall, gräsmattor och utsädesproduktion av gräs. Produkten innehåller tre aktiva substanser som alla har verkningsliknande växthormonet IAA (auxin) men med något olika ogrässpektrum. Blandningen av aktiva substanser ger en bredare effekt än de individuella aktiva substanserna. Preparatet verkar via bladen, men transporteras även ner till rötterna. För god effekt skall dagstemperaturen vara över 12° C, och behandling bör undvikas under perioder med kalla nätter.

Behandling rekommenderas inte när grödan befinner sig i en stressituation p.g.a. kyla, torka, vattensjuk jord, angrepp av skadedjur, avsaknad av näringsämne, risk för nattfrost eller vid mycket höga dagstemperaturer. Regnfast efter 2 timmar.

Gröda	Tidpunkt	Dosering	Karenstid
Höstsäd: Höstvete, höstkorn, råg och rågvete (med eller utan insädd av gräs)	BBCH 21–29 Endast vårbehandling.	2,5 l/ha Max 1 behandling vartannat år	
Höstsäd: Höstvete, höstkorn, råg och rågvete (med eller utan insädd av gräs)	BBCH 30–39 Endast vårbehandling.	2,5 l/ha Max 1 behandling per år	
Vårsäd: Vårvete, vårkorn och havre (med eller utan insädd av gräs)	BBCH 21–29 Endast vårbehandling.	2,25 l/ha Max 1 behandling vartannat år	
Vårsäd: Vårvete, vårkorn och havre (med eller utan insädd av gräs)	BBCH 30–39 Endast vårbehandling.	2,25 l/ha Max 1 behandling per år	
Utsädesproduktion av gräs: Gräsrövall	BBCH 30–40	2,05 l/ha Max 1 behandling vartannat år	Betesdjur får släppas på behandlade områden tidigast 7 dagar efter behandling
Utsädesproduktion av gräs: Gräsrövall	BBCH 41–49	2,05 l/ha Max 1 behandling per år	Betesdjur får släppas på behandlade områden tidigast 7 dagar efter behandling
Gräsvall, slåtter/bete	BBCH 30–40 Endast vårbehandling	2,05 l/ha Max 1 behandling vartannat år	Betesdjur får släppas på behandlade områden tidigast 7 dagar efter behandling
Gräsvall, slåtter/bete	BBCH 41–49 Endast vårbehandling	2,05 l/ha Max 1 behandling per år	Betesdjur får släppas på behandlade områden tidigast 7 dagar efter behandling
Nyetablerade gräsmattor	Från BBCH 30–32 Endast vårbehandling	2,05 l/ha Max 1 behandling vartannat år	
Etablerade gräsmattor	Endast vårbehandling	1,83 l/ha Max 1 behandling per år	

Totala dosen av verksamt ämne på ett fält

När produkten har använts för behandling av sträsäd i BBCH 21-29 får den eller andra produkter innehållande det verksamma ämnet klopyralid inte användas på samma fält under det efterföljande året. När produkten har använts för behandling av nyetablerade gräsmattor eller gräsvall i BBCH 30–40 får den eller andra produkter innehållande det verksamma ämnet klopyralid inte användas på samma fält under det efterföljande året.

Stråsäd (vete, korn, råg, rågvete, havre):

Behandla med medium duschkvälitë i 200–400 l/ha vatten för att ge god täckning av ogräsen. Använd den högre vattenmängden vid tät gröda eller stora ogräs. Grödan skall vara torr vid behandling.

Vall, gräsmattor och utsädesproduktion av gräs.:

Behandla med medium duschkvälitë i 200–400 l/ha vatten, för att ge god täckning av ogräsen. Använd den högre vattenmängden vid tät gröda eller stora ogräs. Betesdjur kan släppas på betet efter 7 dagar.

Beredning av sprutvätska

Börja med väl rengjord spruta. Fyll spruttanken till hälften med vatten och starta omrörning. Skaka behållaren med Kinvara väl innan tillsättning av korrekt dos i tanken. Fyll upp med vatten samt ev. blandningspartner. Kontakta Nordisk Alkali vid frågor kring blandningar. Använd sprutvätskan så snart som praktiskt möjligt. Behåll omrörningen i gång tills behandlingen är färdig.

Vid behandling

- Spruta på torr gröda (spruta ej vid risk för regn).
- Undvik vindavdrift mot känsliga grödor.
- Undvik överlappning.
- Välta eller harva inte inom 7 dagar efter behandling.
- Använd inte Kinvara i vallar där klöver, lucern eller andra baljväxter ingår.

Rengöring av sprututrustningen

Efter behandling rengörs sprutan grundligt med rent vatten och tankrengöringsmedel, t ex All Clear Extra. Se till att slangar och munstycken sköljs igenom. Spruta ut tvättvätska på behandlad gröda. Rengör ej sprututrustningen i närheten av vattendrag och förhindra förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.

Ytterligare villkor

Personlig skyddsutrustning:

Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd. Det året gräsmattan behandlas ska arbetskläder användas vid arbete som innebär kontakt med det behandlade gräset. Arbete som innebär kontakt med behandlat gräs får inte utföras längre än 4 timmar per dag de första 15 dygnet efter behandling.

Hantering av växtmaterial från behandlad gröda

Halm och grovfoder från en behandlad gröda får användas som foder eller strö i det egna jordbruket. Halm och grovfoder från en behandlad gröda och gödsel (ej flytgödsel) som innehåller behandlad halm eller grovfoder får endast bortföras från det egna jordbruket till förbränning. Växtmaterial från en behandlad gröda får inte transporteras från det egna jordbruket för kompostering eller biogasproduktion.

Växtmaterial från en behandlad gröda får inte användas i växthus, svampproduktion eller som täckmaterial för växter.

Efterföljande gröda

Produkten innehåller verksamma ämnen som kan skada efterföljande grödor om odling sker tidigare än följande tid efter behandling med produkten:

- 30 dagar för omsädd med stråsäd, majs och gräs
- 12 månader för potatis, tomater, morötter andra fl ockblommiga växter, baljväxter, sallat, kål och klöver

Produkten innehåller klorpyralid och fl uoroxipyr som kan överföras till efterföljande grödor och riskerar att leda till överskridande av gränsvärden om odling sker tidigare än följande tid efter behandling med produkten:

- nästa växtsäsong, det vill säga nästa vår, för rotgrönsaker och knölgrönsaker
- 125 dagar för övriga grödor.

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan.

Resistenshantering

Upprepad behandling på samma fält med preparat med samma aktiva substans, eller aktiva substanser i samma kemiska familj eller med liknande verkningsätt kan ge upphov till resistens bland ogräsen. För att minska risken rekommenderas att alternera eller kombinera produkter med aktiva substanser från olika kemiska familjer eller med olika verkningsätt, både under odlingssäsongen men även i växtföljden.

Avfallshantering

Tom förpackning får inte återanvändas. De tomma förpackningarna ska sköljas ordentligt med vatten minst tre gånger och ställas upp och ned minst 30 sekunder för avrinning. Sköljvattnet hålls i sprutan och sprutas ut på fältet. Väl rengjorda och torra plastförpackningar med avtagen skruvkork ska lämnas för energiutvinning till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar. Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel lämnas för materialåtervinning vid kommunens återvinningscentral. Företaget är anslutet till SvepRetur (www.svepretur.se). Ej rengjord förpackning och ev. rester av produkten lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Observera

Detta medel är prövat i svenska försök. Anvisningarna grundar sig på resultaten från dessa. Då användningen ligger utanför vår kontroll och vi ej kan förutse alla de omständigheter som kan påverka resultatet i det enskilda fallet, kan vi ej påta oss något ansvar för eventuella skadeverkningar.

Nytt sortmaterial, förändrad odlingsteknik eller uppkommen resistens kan resultera i att preparatet inte ger önskad effekt eller till och med att skador uppstår på grödan. Tillverkaren ansvarar ej för uppkommen skada på grund av sådana förhållanden eller liknande omständigheter, vilka ej kunnat förutses vid preparatets saluförande. Tillverkaren garanterar för varans kvalitet och jämnhet samt att medlet, under normala förhållanden, är ägnat åt de i bruksanvisningen angivna ändamålen. Tillverkaren frångår sig däremot allt ansvar för möjliga skador, otillräcklig eller utebliven effekt som har uppstått i samband med köparens inkorrekt lagring, transport, hantering och användning av produkten.



Nordisk Alkali
GROWING TOGETHER