



## Mot örtogräs i sockerbetor

**Säkrar  
effekten  
på:**



**Åkerbinda**



**Trampört**



**Snärjmåra**

## Behandlingstidpunkt

Centium rekommenderas efter uppkomst när alla betor har minst två välutvecklade örtblad fram till när betorna har åtta örtblad. Ingen behandling med Centium får utföras när betorna är i hjärtbladstadiet.

Dos 0,05–0,075 l/ha. När sockerbetorna har två välutvecklade örtblad.

Den lägre dosen används på jordar med låg lerhalt eller om markytan är fuktig vid behandlingstillfället. Vid efterföljande behandlingar kan dosen ökas till 0,1 l/ha om örtogräsen har mer än ett örtblad. Centium får användas 4 ggr per säsong och den högsta tillåtna totaldosen per säsong är 0,2 l/ha.

Vattenmängd 150–200 l/ha.

Behandling med luftassisterade sprutor rekommenderas inte förrän mer erfarenheter har inhämtats när det gäller denna sprutteknik.

## Blandbarhet

Centium kan blandas med övriga betherbicer.

Blandning med Safari rekommenderas inte förrän sockerbetorna har minst 6 örtblad.

Blandning med manganprodukter kan bara göras om dessa produkter inte innehåller nitratkväve.


Centium får inte blandas med borprodukter eller urea.

## Övrigt

Behandla inte om betorna är stressade av yttre förhållande såsom vindskador eller om de är angripna av svampsjukdomar. Förväntas kraftiga nederbörds mängder över 15 mm avrådes från behandling med Centium.

Centium tillsätts under omrörning varefter tanken fylls. Det skall vara konstant omrörning under påfyllning och utsprutning.

## Utvecklingsstadier – Sockerbetor (BBCH)



OBS Centium kan i vissa fall ge vitfärgade blad på betorna. Betorna fortsätter att växa och de nyproducerade bladen får inte dessa symtom. Undvik om möjligt dubbelsprutning eller överlappning vid behandlingen.

## Efterföljande grödor

Efter en behandling med Centium 36 CS kan följande grödor odlas: stråsäd, oljeväxter, lin, potatis, ärter, åkerbönor, sockerbetor, insådder av gräs eller klöver, kålväxter, lök och morötter.

Före sådd av dessa grödor skall marken plöjas eller djupbearbetas. Detta är extra betydelsefullt om jorden är hårt tillpackad, t ex. i ett körspår, varvid normal nedbrytning av preparatet ej kunnat ske.

## Användningsvillkor enligt GAP

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Skadegörare                     | Örtogräs                                    |
| Tidpunkt BBCH                   | 12–18                                       |
| Karens, dygn                    | 60                                          |
| Antal behandlingar              | 4                                           |
| Dos - max kg, l/ha              | 0,05–0,2 l. Max total dos per säsong: 0,2 l |
| Vattenmängd och spridningsmetod | 200–400 l/ha                                |



Medlem i Svenskt Växtskydd

# Nordisk Alkali

Tel 040 680 85 30 – [info@nordiskalkali.se](mailto:info@nordiskalkali.se) – [www.nordiskalkali.se](http://www.nordiskalkali.se)

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler.