

LEGACY® 500 SC

Herbicid



Verksamt ämne:
Diflufenikan 500 g/L (42 vikt-%)
Formulering:
Suspensionskoncentrat (SC)
Registreringsnummer: 5002
Användarkategori: 2L
Verkningsmekanism: HRAC F1

Tillverkare/Innehavare av godkännandet:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK, Leusden
Nederländerna
www.adama.com

© ADAMA Irvita N.V.

1 Le

Scanna för
användning



LEGACY® 500 SC



Herbicid

Reg. 5002. Användarkategori 2L.

Användningsområden

Mot örtogräs i odlingar av höst- och vårvete, höst- och vårkorn, rågvete, råg och havre.

Läs medföljande anvisningar före användning

VARNING

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Förorena inte vatten med produkten och dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/Undvik förorening via avrinning från gårdsplander och vägar.)
Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare.



Första hjälpen

Vid förtäring kontakta läkare och visa denna förpackning eller etiketten. För mer information se säkerhetsdatablad.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Avfall: Företaget är anslutet till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem (tel: 0370-173 85 eller www.svepretur.se). Rengjord förpackning kan lämnas till SvepRetur. Rester, spill och ej rengjort tomemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras.

Batchnummer och tillverkningsdatum: se förpackning.



UN 3082



ANELGYSELT/05/A
54309A/07

LEGACY® 500 SC

Herbucid

Reg. 5002. Användarkategori 2L.

Användningsområden

Mot örtogräs i odlingar av höst- och vårvete, höst- och vårkorn, rågvete, råg och havre.

Läs medföljande anvisningar före användning

VARNING

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Förorena inte vatten med produkten och dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.)

Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare.



Första hjälpen

Vid förtäring kontakta läkare och visa denna förpackning eller etiketten. För mer information se säkerhetsdatablad.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Avfall: Företaget är anslutet till SvegReturs insamlings- och återvinningssystem (tel: 0370-173 85 eller www.svepretur.se). Rengjord förpackning kan lämnas till SvegRetur. Rester, spill och ej rengjort tomemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras.

Batchnummer och tillverkningsdatum: se förpackning.



UN 3082



SWEDEN

ANLGSYSELIT/05/A
S4309A/07

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Legacy® 500 SC är godkänd för användning mot örtogräs i odlingar av höst- och vårvete, höst- och vårkorn, rågvete, råg och havre enligt nedanstående tabell:

Gröda	Syfte	Behandling			Dos max. L/ha	Behandlings- utrustning/ metod
		Tidpunkt, utv.stadie	Karens, dygn	Antal beh.		
Höstsäd, höst- behandling	örtogräs	DC 00-31 Ogräs 0-6 örtblad	Se sista beh. tidpunkt	1	0,25	Bomspruta
Höstsäd, vårbehandling	örtogräs	DC 21-31 Ogräs 0-6 örtblad	Se sista beh. tidpunkt	1	0,20	Bomspruta
Vårsäd	örtogräs	DC 00-31 Ogräs 0-3 örtblad	Se sista beh. tidpunkt	1	0,15	Bomspruta
Havre	örtogräs	DC 13-31 Ogräs 0-3 örtblad	Se sista beh. tidpunkt	1	0,08*	Bomspruta

*den högsta registrerade dosen är 0,15 L/ha. Vi rekommenderar dock högst 0,08 L/ha då en högre dos kan ge kraftig missfärgning och skador på grödan

Övriga villkor:

Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbrukspruta med bom".

Restriktioner

Legacy® 500 SC som används enligt rekommenderad mängd, har i utförda försök inte visat några skadeverkningar och kan anses som mycket säkert att använda. Vid eventuell omsådd på våren efter en höstbehandling med Legacy® 500 SC, kan vårkorn och vårvete sås efter grundlig harvning. Valfri gröda kan sås efter en plöjning. Hösten efter en vårbehandling med Legacy® 500 SC rekommenderas omsorgsfull och djup jordbearbetning om höstoljeväxter skall sås.

ANVISNINGAR OM ANVÄNDNING

Verkningssätt

Legacy® 500 SC tas upp genom ogräsens blad och verkar som en kontaktherbicid. Den bildar även en film på markytan varifrån groende ogräs tar upp ämnet. På så sätt erhålls en långtidseffekt på ogräs som ännu ej grott vid behandlingstidpunkten. Ogräsen är känsliga fram tills de har 4 örtblad. Effekt syns efter 2-5 dagar. Ogräsen bleknar och vitfärgas och en svedd bladvävnad kan ses. Nya ogräs kan gro normalt för att sedan vitfärgas. Ibland uppstår vita fläckar även på grödan efter behandling. Dessa försvinner inom några dagar och har ingen påverkan på skörderesultatet.

Resistensrisk

Resistens visar sig genom dålig eller bristande effekt vid behandling. Ingen resistens mot diflufenikan har påvisats i Sverige, men var uppmärksam om oväntat dåliga effekter mot normalt känsliga ogräs fås.

För att undvika uppkomst av resistens, var noggrann med följande:

- Använd produkter med olika verkningssätt i växtföljden
- Kör under optimala förhållanden
- Anpassa doseringen efter situation (väder, ogrässtorlek)
- Använd den bästa spruttekniken

OPTIMALA VERKNINGSFÖRHÅLLANDEN VID ANVÄNDNING

- Legacy® 500 SC kan användas ner till +2°C om temperaturutvecklingen är stigande. Om frost förutspås, skall behandlingen utföras först då plantorna är saftspända igen
- God markfukt i samband med behandling och tiden därefter är positivt för behandlingseffekten
- På mullrika jordar är jordverkanseffekten av Legacy® 500 SC nedsatt

Om inte de optimala betingelserna uppfylls kan effekten försämrast.

DOSREKOMMENDATIONER, VATTENMÄNGD OCH BEHANDLINGSTIDPUNKT

Dosera beroende på ogräsen utvecklingsstadier och arter enligt tabellerna på följande sida. Kontrollera effekten genom att lämna en obehandlad yta på minst 25 m² i fältet.

Vattenmängd: 100-300 L/ha

Höstsäd

	Ogräsens utvecklingsstadie		
Ogräsart	0-2 örtblad	3-4 örtblad	5-6 örtblad
Åkerviol	0,06 L/ha	0,12 L/ha	0,12 L/ha
Förgätmigej			0,12 L/ha
Lomme		0,25 L/ha	0,25 L/ha**
Våtarv			*
Veronika	0,25 L/ha		
Plister	0,12 L/ha		
Pilört			
Trampört			
Baldersbrå	*	*	
Snärjmåra	*	*	*

* Med 0,25 L/ha Legacy® 500 SC uppnås en god effekt på aktuella ogräs

** Observera att maxdosen vid vårbehandling av höstsäd är 0,20 L/ha

Vårkorn, havre och vårvete

Ogräsart	Ogräsen utvecklingsstadie	
	0-2 örtblad	3-4 örtblad
Åkerviol	0,06 L/ha	0,15 L/ha OBS. Havre max 0,08 L/ha
Förgätmigej		
Lomme		
Våtarv		

Ogräsart	Ogräsens utvecklingsstadie	
	0-2 örtblad	3-4 örtblad
Veronika	0,15 L/ha OBS. Havre max 0,08 L/ha	*
Pliester		
Pilört		
Trampört	*	
Baldersbrå		
Snärjmåra		

* Med 0,15 L/ha Legacy® 500 SC uppnås en måttlig effekt på aktuella ogräs

För att förstärka effekten mot vissa ogräs, rekommenderas tankblandning med t ex Trimmer® eller Harmony® Plus mot örtogräs och Boxer®/Roxy® eller Lexus® mot gräsogräs.

SPRUTNING

Spridningsteknik

Sprutning skall ske under förhållanden som inte ger upphov till vindavdrift. Följ rekommendationerna enligt broschyren "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom".

Sprutan skall vara funktionstestad och rätt kalibrerad för bästa resultat.

Skyddsutrustning

Vid påfyllning och rengöring av lantbrukssprutan skall försiktighet iakttas. Följ allmänna hygienåtgärder genom att:

- Undvika kontakt med hud, ögon och kläder
- Avstå från mat, dryck, rökning eller snusning vid arbetsplatsen
- Ta av nedsmutsade kläder
- Förvara skyddsutrustning separat
- Tvätta händer före raster
- Duscha och tvätta alla kläder efter arbetspasset

Blandningar

För att komplettera effekten kan Legacy® 500 SC tankblandas med Ally®, Boxer®/Roxy®, Trimmer®/Express®, Harmony® Plus, Hussar®, Monitor®, Attribut® Twin, Chekker® Power, Atlantis®, Lexus®, Primus®, Starane®/Tomahawk® och Starane® XL.

Vid blandningar med ovan nämnda produkter rekommenderas 50-70 mesh filterstorlek.

Beredning av sprutvätska

Vid påfyllning av tank:

- Fyll till hälften med vatten
- Följ rekommenderad dos enligt tabellen
- Håll den uppmätta dosen i den halvfyllda tanken
- Tillsätt eventuellt andra medel och resterande vatten under fortsatt omrörning

Sprutvätskan ska vara under omrörning vid transport och sprutningsarbete.

Vid tillredning av sprutvätska får ingen vätska komma ut i avlopp, åar eller vattentäcker. Använd en biobädd eller en platta med uppsamling.

Rengöring av sprututrustning

Rengör sprututrustningen både utvändigt och invändigt.

Börja med invändig rengöring av sprutan:

1. Töm sprutan
2. Tillsätt därefter en tredjedel av sköljvattentankens innehåll och skölj igenom sprutan
3. Spruta ut det använda sköljvattnet i grödan
4. Fyll på med ytterligare en tredjedel vatten
5. Tillsätt lämpligt rengöringsmedel till andra sköljningen
6. Cirkulera medlet och vattnet i systemet och sprid ut
7. Fyll på med en sista tredjedel vatten
8. Cirkulera vätskan i systemet och sprid ut

Fortsätt med utvändigt rengöring av spruta och traktor. Rengör sprututrustning direkt efter användning för att minska risken för kvarlämnade rester av andra medel.

AVFALL

Tom förpackning får inte återanvändas.

Tomförpackningar ska sköljas omsorgsfullt (minst tre gånger) med vatten som hålls i spruttanken och används vid behandlingen. Låt förpackningen rinna av, upp och ned under minst 30 sekunder. ADAMA är anslutet till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar. Rengjord förpackning kan lämnas till SvepRetur. Tel 0370-173 85 eller www.svepretur.se för information om uppsamlingsplatser. Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid

kommunens återvinningscentral.

Preparatrest, sköljvatten och ej rengjorda förpackningar är miljöfarligt avfall.

Kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning för information om hantering av miljöfarligt avfall.

FÖRVARING

Lagras frostfritt samt åtskilt från födoämnen och utsäde.

ATT BEAKTA

Produktens kvalitet garanteras om varan har erhållits i sluten originalförpackning.

Rekommendationer för produktens användning är inte bindande, men de är baserade på våra senaste kunskaper.

Många faktorer såsom väder, jordart, sorter, resistens, sprutteknik, vattenkvalitet och andra användningssätt kan påverka produktens effekt.

ADAMA frångår sig ansvar i dessa avseenden.

Företaget frångår sig också allt ansvar för skada uppkommen genom felaktig lagring eller användning av produkten.

Registrerade varumärken:

Legacy® - ADAMA Irvita N.V.; Tomahawk®, Trimmer® - ADAMA Agan Ltd.

Ally®, Express®, Harmony®, Lexus® E.I. du Pont de Nemours & Company

Attribut® - Bayer AG

Atlantis® - Bayer S.A.S.

Boxer® - Syngenta Ltd.

Chekker® - Bayer Cropscience AG

Primus®, Starane® - Dow Agrosciences LLC

Hussar® - Bayer Intellectual Property GmbH

Roxy® - Nordisk Alkali

Registrerade varumärken - för ytterligare information om ägandet av dessa, hänvisas till www.prv.se

LEGACY® 500 SC

Herbicid

Verksamt ämne:

DiFlufenikan 500 g/L (42 vikt-%)

Formulering:

Suspensionskoncentrat (SC)

Registreringsnummer: 5002

Användarkategori: 2L

Verkningsmekanism: HRAC F1

Tillverkare/Innehavare av godkännandet:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK, Leusden

Nederländerna

www.adama.com

© ADAMA Irvita N.V.



ADAMA

12 x 1 L

ANELGYSEILT/05/C1
T4309D/07

LEGACY® 500 SC

LEGACY® 500 SC

Herbucid



Verksamt ämne:
DiFlufenikan 500 g/L (42 vikt-%)
Formulering:
Suspensionskoncentrat (SC)
Registreringsnummer: 5002
Användarkategori: 2L
Verkningsmekanism: HRAC F1

Tillverkare/Innehavare av godkännandet:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK, Leusden
Nederländerna
www.adama.com

© ADAMA Irvita N.V.

12 x 1 L

Scanna för
användning



Reg. 5002. Användarkategori 2L.

Användningsområden

Mot örtogräs i odlingar av höst- och vårvete, höst- och vårkorn, rågvete, råg och havre.

Läs medföljande anvisningar före användning

VARNING

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Förorena inte vatten med produkten och dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/Undvik förorening via avrinning från gårdspländer och vägar.)
Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare.



Första hjälpen

Vid förtäring kontakta läkare och visa denna förpackning eller etiketten. För mer information se säkerhetsdatablad.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Avfall: Företaget är anslutet till SvegReturs insamlings- och återvinningssystem (tel: 0370-173 85 eller www.svepretur.se). Rengjord förpackning kan lämnas till SvegRetur. Rester, spill och ej rengjort tomemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras.

Batchnummer och tillverkningsdatum: se förpackning.



UN 3082



ANELGYSELLT/05/C2
T4309C/07

LEGACY[®] 500 SC



SWEDEN

33 x 12 L



ANELGYSE1LT/05/X
T4309P/07

ADAMA
Northern Europe B.V.