

Frupica® SC

Bredverkande svampmedel till jordgubbar

- Effektivt gråmögelmedel med god sidoeffekt mot mjöldagg och svartfläcksjuka
- Både kontaktverkande- och translaminar effekt

Allmän information

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av jordgubbar på friland.

Registreringsnummer 4781

Verksam beståndsdel Mepanipyrim 440 g/l

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/
märkning Varning/GHS07; H315/GHS08; H351/GHS09; H410.
Se sida 95

Förpackning 5 l

Lagring Torrt och svalt. Undvik frost

UPMA Skogsplantaskolor. Se sida 93

Registreringsinnehavare Nordisk Alkali AB

Verkningsätt

Den verksamma beståndsdel i Frupica SC, mepanipyrim, tillhör den kemiska gruppen anilinopyrimidiner, med mycket god effekt mot gråmögel i jordgubbar. Frupica SC har dessutom en god effekt mot mjöldagg och svartfläcksjuka vid användning i den högre rekommenderade dosen.

Frupica är kontaktverkande och har även translaminar verkan (god inträngning i plantan). Detta innebär att Frupica både har en förebyggande samt även en viss kurativ effekt mot gråmögelsvampen.

Användning

Frupica SC ska användas förebyggande mot gråmögel och mjöldagg. Första behandlingen mot gråmögel görs i början av blomningen (5–10 % utslagna blommor). Vid användning i mjöldaggskänsliga jordgubbssorter ska första behandlingen göras strax före blom.

För att undvika resistensproblem ska Frupica SC användas i ett behandlingsprogram tillsammans med andra svampmedel med annorlunda verkningsmekanism. Använd inte Frupica mer än två gånger i samma behandlingsprogram.

Dos 0,8–0,9 l/ha. Den högre dosen är nödvändig för god mjöldaggseffekt.

Vattenmängd 500–1 000 l/ha.

Sprutteknik

Frupica kan användas med vanlig bredspruta. En god täckning av behandlade växtdelar är nödvändig för ett bra resultat. Behandla ej i starkt solsken.

Användningsvillkor Frupica SC

Gröda	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/säsong (min–max)	Max antal behandlingar/år	Behandlings- intervall dagar	Karenstid (dgn)	Max dos vid varje behandling	Övrigt
Jordgubbar på friland	Mot svampangrepp	Bomspruta	BBCH 59–66	2	5	7	0,9 l/ha	



Planttolerans

Frupica SC har provats på ett stort antal olika sorter utan problem. Frupica kan användas på jordgubbsplantans samtliga utvecklingsstadier (Observera dock karenstiden och utvecklingsstadium då det är tillåtet att utföra behandling).

Ytterligare villkor för användning

Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.

Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom"

