

GOLTIX® SC 700

Herbucid



Verksamt ämne:
metamitron 700 g/L (57,9 vikt-%)

Formulering:
suspensions koncentrat (SC)

Registreringsnummer: 5259

Användarkategori: 2L

Verkningsmekanism: HRAC C1

Tillverkare/Innehavare av godkännandet:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden

Nederländerna

www.adama.com

Scanna för
användning



5 L e

© ADAMA Quena N.V.

ANEGOLSE5LT/04/A
JT097A/16

GOLTIX® SC 700

Herbucid

Reg. 5259. Användarkategori 2L.

Användningsområden

Godkänd för bekämpning av ogräs i följande grödor:

- Sockerbetor
- Foderbetor
- Rödbetor

Läs medföljande anvisningar före användning

VARNING

Skadligt vid förtäring.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Innehåller 5-kloro-2-metyl-4-isotiazolin-3-on och 2-metyl-4-isotiazolin-3-on.

Kan orsaka en allergisk reaktion.

VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Samla upp spill.

Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.



Avfall:

Företaget är anslutet till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem (tel: 0370-173 85 eller www.svepretur.se). Rengjord förpackning kan lämnas till SvepRetur. Rester, spill och ej rengjord tomemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras.

Batchnummer och tillverkningsdatum: se förpackning



öppna här



RISK, SKYDD OCH FÖRSTA HJÄLPEN

ANVÄNDNING OCH DOSERING



8 718077 000046 >

UN 3082



SWEDEN

ANEGOLSESLT/04/B
JS097B/16

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Goltix® 700 SC är godkänd för användning i sockerbetor, foderbetor och rödbetor enligt nedanstående tabell:

Gröda	Syfte	Behandling				Max dos L/ha	Behandlingsmetod
		Tidpunkt, utv. stadiet	Karenstid (dygn)	Max. antal beh.	Behandlingsintervall (dygn)		
Sockerbetor, foderbetor och rödbetor	Mot ogräs	10-18	Ingen karenstid finns. Styrd av sista beh. tidpunkt	1 - 4	7 - 14	1,5 L per tillfälle, 3 L per säsong	Bomspruta

Övriga villkor

Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom".

Restriktioner

Goltix® 700 SC som används enligt rekommenderad mängd, har i utförda försök med socker- och foderbetor inte visat några skadeverkningar och kan anses som mycket säkert att använda. Omsådd på Goltix® behandlade fält kan ske med betor. Efter plöjning kan även majs, potatis eller äkerbönor säs på fältet, samt stråsäd på hösten.

ANVISNINGAR OM ANVÄNDNING

Verknings sätt

Goltix® 700 SC är systemiskt verkande med god verkan såväl via ogräsen rötter som blad. Goltix® 700 SC används antingen före, vid eller efter sådden samt efter uppkomsten av sockerbetor och foderbetor.

Metamitron blockerar fotosyntesen och bladen hos känsliga plantor vissnar med början mellan nerv och bladkant. Efterhand vissnar hela bladet och planta dör.

Preparatet är effektivt mot bl.a baldersbrå, lomme, målla, nattskatta, nässla, penningört, plister, vitgröe, våtarv, m fl. Effekten är måttlig mot snärjmåra, äkerbinda och åkersenap. Tistelarter och andra fleråriga arter är svårbekämpade. Säkra effekt uppnås när ogräsen är i hjärtbladstadiet.

Resistensrisk

Resistens visar sig genom dålig eller bristande effekt vid behandling. Ingen verifierad

ogräsresistens mot metamitron har påvisats i Sverige, men var uppmärksam om oväntat dåliga effekter mot normalt känsliga ogräs fås.
Goltix® 700 SC tillhörer HRAC klass C1.

OPTIMALA VERKNINGSFÖRHÅLLANDEN VID ANVÄNDNING

Ogräsbekämpning i betor utförs som behandlingsprogram med upprepad användning av Goltix® 700 SC eller Goltix® 700 SC -kombinationer i låga doser. Behandlingsprogrammen påbörjas antingen före ogräsen uppkomst (jordherbicidanvändning) eller mera vanligen vid ogräsen uppkomst i deras hjärtbladsstadium.

Tänk på att:

- Hög mullhalt försvagar effekten
- Strukturen bör vara jämn - ej grov och kokig
- Hög markfuktighet har positiv effekt och ihållande torka kan reducera preparatets jordverkan mot ogräset. Vid torrt väder spruta lämpligen tidigt på morgonen
- Spruta inte vid starkt solsken och temperaturer över 25°C eller vid starka temperaturväxlingar mellan dag och natt (nattfrost). Detta gäller särskilt om blandning sker med fenmedifamprodukter (tex Betanal Power). Efter en period med regnigt och svalt väder och omslag till värme uppskjuts sprutningen ett par dagar
- Spruta inte om betorna är försvagade eller skadade på grund av storm, insekt sangrepp, herbicidpåverkan etc utan vänta tills betorna hämtat sig och är i god kondition.
- Beakta rekommenderade tidsintervall mellan Goltix® 700 SC-behandling och kvickrotsbekämpning.

DOSREKOMMENDATIONER, VATTENMÄNGD OCH BEHANDLINGSTIDPUNKT

Följ rekommendationerna i tabellen nedan. Kontrollera effekten genom att lämna en yta på minst 25 m² i fältet.

Vattenmängd: 100-300 L/ha

Behandling 1 ¹	Behandling 2-3 ²	Behandling 4 ³
Ogräsen tidiga hjärtbladsstadium, L/ha		
0,5-1,5 L Goltix® 700 SC + 0,3-0,5 L Superolja/ha	0,75-1,0 L Goltix® 700 SC + 0,3-0,5 L Superolja/ha	0,75-1,5 L Goltix® 700 SC + 0,3-0,5 L Superolja/ha

¹ Använd den högre doseringen på fält med riklig förekomst av vitgröe, baldersbrå eller kamomill

² En del ogräs har skadats men ej dött, andra har kommit upp senare. Påbörja

sprutning så snart en ny ogräsgeneration befinner sig i hjärtbladstadium
3 Finns det fortfarande skadade, men ej döda ogräs i fältet eller nygrodda ogräs, behandla ytterligare en gång när ogräsen befinner sig i hjärtbladstadium
Bandsprutning kan användas vid sådd eller efter betornas uppkomst. Dosen anpassas med hänsyn till bandbredd och radavstånd enligt formeln:

bandbredd i cm

----- x hektardosen

radavstånd i cm

Spridningsteknik

Sprutning skall ske under förhållanden som inte ger upphov till vindavdrift. Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom".
Sprutan skall vara funktionstestad och rätt kalibrerad för bästa resultat.

SKYDDSDUTRUSTNING

Personlig skyddsutrustning: Vid hantering av produkten eller sprutvätskan samt vid spridning ska skyddshandskar och skyddskläder användas.

Vid arbete med behandlade växtdelar ska skyddshandskar och arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) användas.

Följ allmänna hygienåtgärder genom att:

- Undvika kontakt med hud, ögon och kläder
- Avstå från mat, dryck, rökning eller snusning vid arbetsplatsen
- Ta av nedsmutsade kläder
- Förvara skyddsutrustning separat
- Tvätta händer före raster
- Duscha och tvätta alla kläder efter arbetspasset

BLANDNINGAR

Blandning rekommenderas med Superolja, Betanal Power eller Beta-Baythroid SC 025. Blandning med övriga insektsmedel avrådes. Tillsats av manganpreparat är möjlig till blandningen Goltix® 700 SC + Superolja.

BEREDNING AV SPRUTVÄTSKA

Vid påfyllning av tank:

- Fyll till hälften med vatten
- Följ rekommenderad dos enligt tabellen
- Håll den uppmätta dosen i den halvfyllda tanken

- Tillsätt eventuellt andra medel och resterande vatten under fortsatt omrörning. Sprutvätskan ska vara under omrörning vid transport och sprutningsarbete. Vid tillredning av sprutvätska får ingen vätska komma ut i avlopp, åar eller vattentäcker. Använd en biobädd eller en platta med uppsamling.

RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING

Rengör sprututrustningen både utvändigt och invändigt.

1. Börja med invändig rengöring av sprutan:
2. Töm sprutan
3. Tillsätt därefter en tredjedel av sköljvattentankens innehåll och skölj igenom sprutan
4. Spruta ut det använda sköljvattnet i grödan
5. Fyll på med ytterligare en tredjedel vatten
6. Tillsätt lämpligt rengöringsmedel till andra sköljningen
7. Cirkulera medlet och vattnet i systemet och sprid ut
8. Fyll på med en sista tredjedel vatten
9. Cirkulera vätskan i systemet och sprid ut

Fortsätt med utvändigt rengöring av spruta och traktor. Rengör sprututrustning direkt efter användning för att minska risken för kvarlämnade rester av andra medel.

AVFALL

Tom förpackning får inte återanvändas.

Tomförpackningar ska sköljas omsorgsfullt (minst tre gånger) med vatten som hälls i spruttanken och används vid behandlingen. Låt förpackningen rinna av, upp och ned under minst 30 sekunder. ADAMA är anslutet till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar. Tel. 0370-173 85 eller www.svepretur.se för information om uppsamlingsplatser. Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid kommunens återvinningscentral. Preparatrester, sköljvatten och ej rengjorda förpackningar är miljöfarligt avfall.

Kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning för information om hantering av miljöfarligt avfall.

FÖRVARING

Lagras frostfritt samt åtskilt från födoämnen och utsäde.

ATT BEAKTA

Produktens kvalitet garanteras om varan har erhållits i sluten originalförpackning. Rekommendationer för produktens användning är inte bindande, men de är baserade på våra senaste kunskaper. Många faktorer såsom väder, jordart, sorter, resistens,

sprutteknik, vattenkvalitet och andra användningssätt kan påverka produktens effekt. ADAMA fråntar sig ansvar i dessa avseenden. Företaget fråntar sig också allt ansvar för skada uppkommen genom felaktig lagring eller användning av produkten.

® ADAMA Quena N.V.

SPECIMEN



GOLTIX® SC 700

Herbicide

Reg. 5259. Andvändarkategori 2L.

Användningsområden

Godkänd för bekämpning av ogräs i följande grödor:

- Sockerbetor
- Foderbetor
- Rödbetor

Läs medföljande anvisningar före användning

VARNING

Skadligt vid förtäring.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Innehåller 5-kloro-2-metyl-4-isotiazolin-3-on och 2-metyl-4-isotiazolin-3-on.

Kan orsaka en allergisk reaktion.

VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Samla upp spill.

Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.



Avfall:

Företaget är anslutet till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem (tel: 0370-173 85 eller www.svepretur.se). Rengjord förpackning kan lämnas till SvepRetur. Rester, spill och ej rengjord tomemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras.

Batchnummer och tillverkningsdatum: se förpackning



8 718077 000046 >

UN 3082



SWEDEN

ANEGOLSESLT/04/B
JS097B/16

GOLTIX[®] SC 700

Herbicide

Verksamt ämne:
metamitron 700 g/L (57,9 vikt-%)
Formulering:
suspensions koncentrat (SC)
Registreringsnummer: 5259
Användarkategori: 2L
Verkningsmekanism: HRAC C1

Tillverkare/Innehavare av godkännandet:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden
Nederländerna
www.adama.com

© ADAMA Quena N.V.

4 x 5 L



ANEGOLSELT/04/C1
JT097C/16

GOLTIX[®] SC 700

GOLTIX® SC 700

Herbucid



Verksamt ämne:
metamitron 700 g/L (57,9 vikt-%)
Formulering:
suspensions koncentrat (SC)
Registreringsnummer: 5259
Användarkategori: 2L
Verkningsmekanism: HRAC C1

Tillverkare/Innehavare av godkännandet:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden
Nederländerna
www.adama.com

© ADAMA Quena N.V.

4 x 5 L

Scanna för
användning



Reg. 5259. Andvändarkategori 2L.

Användningsområden

Godkänd för bekämpning av ogräs i följande grödor:

- Sockerbetor
- Foderbetor
- Rödbetor

Läs medföljande anvisningar före användning

VARNING

Skadligt vid förtäring.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Innehåller 5-kloro-2-metyl-4-isotiazolin-3-on och 2-metyl-4-isotiazolin-3-on.
Kan orsaka en allergisk reaktion.

VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta
GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
Samla upp spill.
Innehållet/behållaren lämnas till
godkänd avfallsmottagare.
Förorena inte vatten med produkten eller dess
behållare.

**För att undvika risker för människors hälsa och för miljön,
följ bruksanvisningen.**



Avfall:

Företaget är anslutet till SvegReturs insamlings- och återvinningssystem (tel: 0370-173 85 eller www.svepretur.se). Rengjord förpackning kan lämnas till SvegRetur. Rester, spill och ej rengjort tomemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras.

Batchnummer och tillverkningsdatum: se förpackning



8 718077 000053 >

UN 3082



SWEDEN

ANEGOLSELT/04/C2
JT097D/16

GOLTIX[®] SC 700



SWEDEN

30 x 20 L



ANEGOLSE5LT/04/X
T097P/16

ADAMA
Northern Europe B.V.