



Mirador®

250 SC



SVAMPMEDEL

Reg. 5021. Behörighetsklass 2L. Endast för yrkesmässigt bruk efter särskilt tillstånd.

Godkänd för bekämpning av svamp i följande grödor:

- Höstvet, vårvete, råg, rågvete, höstkorn, vårkorn, havre, raps, rybs, potatis, sockerbetor, ärtor, åkerbönor, sallatslök, gräslök, jordgubbar, morot, palsternacka, persiljerot, kepalök, scharlottenlök, vitlök, dill, persilja, stjälkselleri, rödkål, vitkål, blomkål, broccoli, savoykål, brysselkål, grönkål, kinakål, sallat, rucola, purjolök, rödbeta, kålrot, rova, skogsplantskolor och gräsfrö

Alla annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts

Läs medföljande anvisningar före användning.

Riskupplysningar

Mycket giftig för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Skyddsanvisningar

Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

Använd andningsskydd vid risk för inandning.

Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.

Första hjälpen

Vid inandning, tag ut personen i frisk luft. Sök läkarhjälp vid obehag.

Vid kontakt med ögonen, tag ut kontaktlinser och skölj med vatten vid sveda.

Vid kontakt med huden, tvätta genast med mycket vatten.

Vid förtäring, skölj munnen med vatten, framkalla ej kräkning. Kontakta läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

För mer information se säkerhetsdatablad

För att undvika risker för människa och miljö, följ bruksanvisningen.



Miljöfarlig

Innehåll: Produkten är ett Suspensionskoncentrat (SC) innehållande 250 g/l (22,9 vikt-%) azoxystrobin.

Tomemballage: Företaget är anslutet till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem (tel: 0370-173 85 eller www.svepretur.se) Rester, spill och ej regjort tomemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras.

Tillverkare/Innehavare av godkännandet:

Makhteshim-Agan Holland B.V., Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden, The Netherlands, www.mabeno.com

© Irvita Plant Protection N.V.- Member of the Makhteshim-Agan Group

Nettoinnehåll: **5 L**

UN 3082



SWEDEN



Produktfakta
Medlets verkan: Svampmedel
Registreringsnummer: 5021
Behörighetsklass: 2L
Formulering: Suspensionskoncentrat (SC)
Verksamt ämne: 250 g/l azoxystrobin
Förpackning: 5 liter



ANVÄNDNINGSVILLKOR

Mirador © 250 SC är godkänd för användning i odlingar av stråsäd, raps, rybs, potatis, sockerbetor,ärter, äkerbönor, sallatslök, gräslök, jordgubbar, morot, palsternacka, persiljerot, kepalök, schalottenlök, vitlök, dill, persilja, stjälkselleri, rödkål, vitkål, blomkål, broccoli, savoykål, brysselkål, grönkål, kinakål, sallat, rucola, purjolök, rödbeta, kålrot, rova, skogsplantskolor samt gräsfrö enligt nedanstående tabell:

Gröda	Skadegörare	Behandling					Spridnings- metod
		Tidpunkt, utv.stadie	Karens, dygn	Antal beh.	Intervall, dagar	Dos max l/ha	
Vete	Septoria (Brunfläcksjuka), Vetets bladfläcksjuka, Gulrost, Brunrost, Söttdagssvampar	30-61	Se sista beh. tidpunkt	1-2	21-30	1 l per säsong	Bomspruta
Råg	Mjöldagg, Sköldfläcksjuka, Brunrost	32-61	Se sista beh. tidpunkt	1		1 l	Bomspruta
Rågvete	Mjöldagg, Sköldfläcksjuka, Brunrost, Gulrost, Septoria	32-61	Se sista beh. tidpunkt	1-2	21-30	1 l per säsong	Bomspruta
Havre	Bladfläcksjuka, Kronrost	33-61	Se sista beh. tidpunkt	1		0,5 l	Bomspruta
Korn	Mjöldagg, Bladfläcksjuka, Kornrost, Sköldfläcksjuka	30-61	Se sista beh. tidpunkt	1-2	21-30	1 l per säsong	Bomspruta
Raps, rybs	Svartfläcksjuka, Bomullsmögel	65-75	28 dagar	1-2	21-30	1 x 1,0 eller 2 x 0,5	Bomspruta
Potatis	Torrfläcksjuka	71-89	14 dagar	1-2	10-14	2 x 0,5	Bomspruta
Gräsfrö	Rost, Mjöldagg	32-55	Se sista beh. tidpunkt	1-2	Min 14	1,0 per behandling	Bomspruta
Skogsplantskolor	Tallskytt	Från början av juli till förhöst	Min 10 dagar till hantering av plantor	Barrot: 1-2 Täckrot: max 5	Min 21	1,0 per behandling	Bomspruta
Dill	Alternaria bladfläckar, Bladfläcksjuka Bomullsmögel	13-39	14 dagar	1-2	Min 7	1,0 per behandling	Bomspruta
Gräslök	Rost	15-45	7 dagar	1-2	Min 7	1,0 per behandling	Bomspruta
Jordgubbar	Gråmögel, Mjöldagg	51-77	7 dagar	1-3	Min 7	1,0 per behandling	Bomspruta
Kinakål	Svartfläcksjuka, Pythiumröta, Bladfläckar	41-49	14 dagar	1-2	Min 12	1,0 per behandling	Bomspruta
Kål (rödkål och vitkål, blomkål, broccoli, savoykål, brysselkål, grönkål)	Svartfläcksjuka, Ringfläcksjuka, Vitrost	41-49	14 dagar	1-2	Min 12	1,0 per behandling	Bomspruta
Kålrot och rova	Svartfläcksjuka, Ringfläcksjuka, Vitrost	37-39	40 dagar	1-2	Min 21	1,0 per behandling	Bomspruta
Lök (kepalök, schalottenlök, vitlök) och sallatslök	Lökbladmögel, Gråmögel-bladfläcksjuka	15-45	14 dagar	1-3	Min 7	1,0 per behandling, 2,0 per säsong	Bomspruta
Morötter, persiljerot och palsternacka	Mjöldagg, Alternaria och Cercospora, Bladfläckar	11-49	10 dagar	1-2	Min 7	1,0 per behandling	Bomspruta
Persilja	Bladmögel, Bladfläckar orsakade av Septoria petroselini	13-30	14 dagar	1-2	Min 7	1,0 per behandling	Bomspruta
Purjolök	Bladmögel, Bladfläckar orsakade av Septoria petroselini	12-47	42 dagar	1-3	Min 12	1,0 per behandling, 2,0 per säsong	Bomspruta
Rucola	Kålbladmögel	13-39	14 dagar	1-2	Min 7	1,0 per behandling	Bomspruta
Rödbetor	Ramularia, Bladfläckar orsakade av Cercospora beticola, Betmjöldagg, Betrost	37-39	40 dagar	1-2	Min 21	1,0 per behandling	Bomspruta
Sallat	Sallatsbladmögel	13-39	14 dagar	1-2	Min 7	1,0 per behandling	Bomspruta
Sockerbetor	Ramularia, Bladfläckar orsakade av Cercospora beticola, Betmjöldagg, Betrost	37-39	40 dagar	1-2	Min 21	1,0 per behandling	Bomspruta
Stjälkselleri	Selleri- bladfläcksjuka	11-49	14 dagar	1-2	Min 14	1,0 per behandling	Bomspruta
Äkerböna	Chokladfläcksjuka, Bönrost, Bönfläcksjuka	60-69	35 dagar torkad böna och 14 dagar färsk böna	1-2		1,0 per säsong	Bomspruta
Ärter (konservärt och till mogen skörd)	Ärtbladmögel Ärtfläcksjuka	60-69	35 dagar torkad ärt och 14 dagar färsk ärt	1-2		1,0 per säsong	Bomspruta

Övriga villkor

- För att begränsa riskerna för vattenlevande organismer ska de anvisningar iakttas som framgår av Naturvårdsverkets allmänna råd 97:3 och den hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd som tillhör Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel.

Restriktioner

Mirador © 250 SC som används enligt rekommenderad mängd, har i utförda försök inte visat några skadeverkningar och kan anses som mycket säkra att använda. Det finns inga restriktioner gällande omsädd eller efterföljande gröda.

Produktfakta
Medlets verkan: Svampmedel
Registreringsnummer: 5021
Behörighetsklass: 2L
Formulering: Suspensionskoncentrat (SC)
Verksamt ämne: 250 g/l azoxystrobin
Förpackning: 5 liter



ANVÄNDNINGSVILLKOR

Mirador® 250 SC är godkänd för användning i odlingar av stråsäd, raps, rybs, potatis, sockerbetor, ärtor, äkerbönor, sallatslök, gräslök, jordgubbar, morot, palsternacka, persiljerot, kepalök, schalottenlök, vitlök, dill, persilja, stjälkselleri, rödkål, vitkål, blomkål, broccoli, savoykål, brysselkål, grönkål, kinakål, sallat, rucola, purjolök, rödbeta, kålrot, rova, skogsplantskolor samt gräsrö enligt nedanstående tabell:

Gröda	Skadegörare	Behandling				Dos max l/ha	Spridningsmetod
		Tidpunkt, utv.stadie	Karens, dygn	Antal beh.	Intervall, dagar		
Vete	Septoria (Brunfläcksjuka), Vetets bladfläcksjuka, Gulrost, Brunrost, Sottdagssvampar	30-61	Se sista beh. tidpunkt	1-2	21-30	1 l per säsong	Bomspruta
Råg	Mjöldagg, Sköldfläcksjuka, Brunrost	32-61	Se sista beh. tidpunkt	1		1 l	Bomspruta
Rågvete	Mjöldagg, Sköldfläcksjuka, Brunrost, Gulrost, Septoria	32-61	Se sista beh. tidpunkt	1-2	21-30	1 l per säsong	Bomspruta
Havre	Bladfläcksjuka, Kronrost	33-61	Se sista beh. tidpunkt	1		0,5 l	Bomspruta
Korn	Mjöldagg, Bladfläcksjuka, Kornrost, Sköldfläcksjuka	30-61	Se sista beh. tidpunkt	1-2	21-30	1 l per säsong	Bomspruta
Raps, rybs	Svartfläcksjuka, Bomullsmögel	65-75	28 dagar	1-2	21-30	1 x 1,0 eller 2 x 0,5	Bomspruta
Potatis	Torrfläcksjuka	71-99	14 dagar	1-2	10-14	2 x 0,5	Bomspruta
Gräsrö	Rost, Mjöldagg	32-55	Se sista beh. tidpunkt	1-2	Min 14	1,0 per behandling	Bomspruta
Skogsplantskolor	Tallskytt	Från början av juli till högst	Min 10 dagar till hantering av plantor	Barrot: 1-2 Täckrot: max 5	Min 21	1,0 per behandling	Bomspruta
Dill	Alternaria bladfläckar, Bladfläcksjuka Bomullsmögel	13-39	14 dagar	1-2	Min 7	1,0 per behandling	Bomspruta
Gräslök	Rost	15-45	7 dagar	1-2	Min 7	1,0 per behandling	Bomspruta
Jordgubbar	Gråmögel, Mjöldagg	51-77	7 dagar	1-3	Min 7	1,0 per behandling	Bomspruta
Kinakål	Svartfläcksjuka, Pythiumröta, Bladfläckar	41-49	14 dagar	1-2	Min 12	1,0 per behandling	Bomspruta
Kål (rödkål och vitkål, blomkål, broccoli, savoykål, brysselkål, grönkål)	Svartfläcksjuka, Ringfläcksjuka, Vitrost	41-49	14 dagar	1-2	Min 12	1,0 per behandling	Bomspruta
Kålrot och rova	Svartfläcksjuka, Ringfläcksjuka, Vitrost	37-39	40 dagar	1-2	Min 21	1,0 per behandling	Bomspruta
Lök (kepalök, schalottenlök, vitlök) och sallatslök	Lökbladmögel, Gråmögel-bladfläcksjuka	15-45	14 dagar	1-3	Min 7	1,0 per behandling, 2,0 per säsong	Bomspruta
Morötter, persiljerot och palsternacka	Mjöldagg, Alternaria och Cercospora, Bladfläckar	11-49	10 dagar	1-2	Min 7	1,0 per behandling	Bomspruta
Persilja	Bladmögel, Bladfläckar orsakade av Septoria petroselini	13-30	14 dagar	1-2	Min 7	1,0 per behandling	Bomspruta
Purjolök	Bladmögel, Bladfläckar orsakade av Septoria petroselini	12-47	42 dagar	1-3	Min 12	1,0 per behandling, 2,0 per säsong	Bomspruta
Rucola	Kålbladmögel	13-39	14 dagar	1-2	Min 7	1,0 per behandling	Bomspruta
Rödbetor	Ramularia, Bladfläckar orsakade av Cercospora beticola, Betmjöldagg, Betrost	37-39	40 dagar	1-2	Min 21	1,0 per behandling	Bomspruta
Sallat	Sallatsbladmögel	13-39	14 dagar	1-2	Min 7	1,0 per behandling	Bomspruta
Sockerbetor	Ramularia, Bladfläckar orsakade av Cercospora beticola, Betmjöldagg, Betrost	37-39	40 dagar	1-2	Min 21	1,0 per behandling	Bomspruta
Stjälkselleri	Selleri-bladfläcksjuka	11-49	14 dagar	1-2	Min 14	1,0 per behandling	Bomspruta
Äkerböna	Chokladfläcksjuka, Bönrost, Bönfläcksjuka	60-69	35 dagar torkad böna och 14 dagar färsk böna	1-2		1,0 per säsong	Bomspruta
Ärtor (konserverat och till mogen skörd)	Ärtbladmögel Ärtfläcksjuka	60-69	35 dagar torkad ärt och 14 dagar färsk ärt	1-2		1,0 per säsong	Bomspruta

Övriga villkor

För att begränsa riskerna för vattenlevande organismer ska de anvisningar iaktas som framgår av Naturvårdsverkets allmänna råd 97:3 och den hjälprea för bestämning av vindanpassat skyddsvstånd som tillhör Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel.

Restriktioner

Mirador® 250 SC som används enligt rekommenderad mängd, har i utförda försök inte visat några skadeverkningar och kan anses som mycket säker att använda. Det finns inga restriktioner gällande omsådd eller efterföljande gröda.



Anvisningar om användning

Verkningssätt

Mirador © 250 SC innehåller den systemiska verksamma beståndsdelen azoxystrobin vilken tillhör gruppen strobiluriner. Azoxystrobin stoppar svampens utveckling genom att blockera dess andningsprocess. Azoxystrobin verkar systemiskt i plantan och har dessutom en bladgenomträngande (translaminär) effekt. Preparatet har i första hand en förebyggande effekt men också en kurativ effekt på svampsjukdomar. Mirador © bekämpar svampsjukdomar mest effektivt när svampen etablerar sig på plantan, därför skall behandling ske så snart de första sjukdomssymptomen kan ses eller vid risk för kommande angrepp. Plantan skyddas mot svampangrepp de kommande 2-4 veckorna beroende av växtstadium, tillväxthastighet, sjukdomsangrepp och dosering.

Resistensrisk

Resistens visar sig genom dålig eller bristande effekt vid behandling. Mjöldagg, septoria och vetets bladfläcksjuka har utvecklat en resistens mot strobilurinernas effekt. I viss mån gäller det även kornets bladfläcksjuka.

För att undvika uppkomst av ytterligare resistens, var noggrann med följande:

- Anpassa doseringen efter situation (väder, svamptryck)
- Blanda och/eller alternera produkter med olika verknings sätt
- Använd den bästa spruttekniken

Optimala verkningsförhållanden vid användning

Behandling tidigt i svampens utvecklingsfas, dvs då symptomen på angrepp är små. Behandla alltid på upptorkad gröda.

Dos, vattenmängd och behandlingstidpunkt

Bäst effekt mot den enskilda svampsjukdomen uppnås när svampen är aktiv och på ett tidigt utvecklingsstadium. Om svamp-angrepp uppträder tidigt på säsongen eller förekommer under en längre period krävs ofta ytterligare en behandling. Antalet behandlingar och tidpunkten för den enskilda behandlingen bör anpassas efter sjukdomsförekomst.

Följ rekommendationerna i tabellen nedan. Den lägre doseringen används förbyggande eller vid begynnande angrepp. På utvecklade angrepp skall den högre dosen användas.

Vid användning i stråsäd skall det alltid blandas med en bredspektrad produkt.

Kontrollera effekten genom att lämna en yta på minst 25 m² i fältet.

Vattenmängd i stråsäd, raps, ryps, potatis, åkerböna, ärtor och skogsplantaskolor: 150-300 l/ha. Gräsfrö: 100-200 l/ha. Jordgubbar och grönsaker: 300 l/ha. Purjolök: 150-250 l/ha

Gröda	Dos, l/ha	Tidpunkt, utv stadium	Skadegörare	Anmärkningar
Höst- och vårvete	0,5-1,0	30-61	Septoria (Brunfläcksjuka) Vetets bladfläcksjuka Gulrost Brunrost Sotdaggsvarpar	Ofta är 0,25-0,5 l/ha tillräckligt. Vid tidiga angrepp eller känsliga sorter kan två behandlingar vara aktuellt, använd då den lägre doseringen av Mirador®. Max 2 behandlingar med 21-30 dagars intervall.
Råg	0,5-1,0	32-61	Mjöldagg Sköldfläcksjuka Brunrost	Vid samtida angrepp av sköldfläcksjuka och/eller mjöldagg använd Stereo (0,8-1,2 l/ha) samt den lägre doseringen av Mirador®. Max 1 behandling.

Gröda	Dos, l/ha	Tidpunkt, utv stadium	Skadegörare	Anmärkningar
Rågvete	0,5-1,0	32-61	Mjöldagg Sköldfläcksjuka Brunrost Gulrost Septoria	Vid samtida angrepp av sköldfläcksjuka och/eller mjöldagg använd Unix® (0,5- 0,75 kg/ha) samt den lägre doseringen av Mirador®. Max 2 behandlingar med 21- 30 dagars intervall.
Havre	0,5	33-61	Bladfläcksjuka, Kronrost	Max 1 behandling.
Höst- och vårkorn	0,5-1,0	30-61	Mjöldagg Bladfläcksjuka Kornrost Sköldfläcksjuka	Ofta är 0,25-0,4 l/ha tillräckligt. Vid samtida angrepp av sköldfläcksjuka och/eller mjöldagg använd Stereo (0,4-1,2 l/ha) samt den lägre doseringen av Mirador. En behandling är ofta tillräcklig. Vid tidiga angrepp (DC 30-32) kan två behandlingar vara aktuellt, använd då de lägre doseringarna. Max 2 behandlingar med 21-30 dagars intervall.
Raps, rybs	1 x 1,0 eller 2 x 0,5	65-75	Svartfläcksjuka Bomullsmögel	Behandling mot svartfläcksjuka bör ske när 50-70% av skidorna har nått full storlek. Behandling mot bomullsmögel bör ske i full blom. Använd den högre doseringen vid kraftiga angrepp. Max 2 behandlingar med 21-30 dagars intervall.
Potatis	0,3-0,5 och 0,3-0,5	71-89	Torrfläcksjuka (<i>Alternaria</i>)	Mot torrfläcksjuka (<i>Alternaria</i>) i slutet av juli och början av augusti. Två behandlingar med 10-14 dagars intervall i tankblandning med Shirlan® rekommenderas. Anpassa doseringen efter angreppsnivån.
Gräsfrö	0,5-1,0	32-55	Rost (<i>Puccinia spp.</i>) Mjöldagg (<i>Erysiphe graminis</i>)	I engelskt rajgräs ger Mirador® måttlig till god effekt mot svartrost och mjöldagg. Effekten mot kronrost är svagare. I ängsgröe ger Mirador® måttligtill god effekt mot rostsjukdomar på bladen samt mot mjöldagg. I ängssvingel ger Mirador® svag effekt mot bladfläcksvampar. Max 2 behandlingar/säsong. Minst 14 dagars intervall mellan behandlingarna.
Skogsplantskolor	1,0	Från början av juli till förhöst	Tallskytt (<i>Lophodermium seditiosum</i>)	Första behandlingen i början av juli. Tidsintervallet mellan behandlingar bör vara minst 21 dagar. Behandlingssäsongen omfattar sommar och förhöst. I odlingar av barrotsplantor och liknande system: Högst 2 behandlingar per säsong. I odlingar av täckrotsplantor: Högst 5 behandlingar per säsong. Under regnrika år dock högst 3 behandlingar per säsong. I bekämpningsprogram med mer än 3 behandlingar per

Gröda	Dos, l/ha	Tidpunkt, utv stadium	Skadegörare	Anmärkningar
				säsong, bör Mirador® alterneres med annat svampbekämpningsmedel. Säkerhetstiden, mellan besprutning och hantering av plantorna, bör vara minst 10 dagar.
Dill	0,8-1,0	13-39	Alternaria bladfläckar (<i>Alternaria alternata</i>) Bladfläcksjuka (<i>Cercosporidium punctum</i>) Bomullsmögel (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	God effekt mot bladfläckar (<i>Alternaria alternata</i> och <i>Cercosporidium punctum</i>). Effektivt mot bomullsmögel i kronhill. Max 2 behandlingar/säsong. Minst 7 dagars intervall mellan behandlingarna.
Gräslök	0,5-1,0	15-45	Rost (<i>Puccinia allii</i>)	Dosering under 0,8 l/ha rekommenderas inte. Måttlig till god effekt mot rost. Max 3 behandlingar/säsong. Max 2 l/ha och säsong. Minst 7 dagars intervall mellan behandlingarna.
Jordgubbar	0,5-1,0	51-77	Gråmögel (<i>Botrytis cinerea</i>) Mjöldagg (<i>Sphaerotheca macularis</i>)	Dosering under 0,8 l/ha rekommenderas inte. Måttlig till god effekt mot gråmögel och mjöldagg i jordgubbar. Max 3 behandlingar/säsong. Max 2 l/ha och säsong. Minst 7 dagars intervall mellan behandlingarna.
Kinakål	0,8-1,0	41-49	Svartfläcksjuka (<i>Alternaria spp.</i>) Pythium-röta (<i>Pythium tracheipileum</i>) Bladfläckar (<i>Pseudocercospora capsellae</i>)	Mycket god effekt mot bladfläckar orsakade av <i>Pseudocercospora capsella</i> vid förebyggande behandling. Effekten mot röta orsakad av <i>Pythium tracheipileum</i> är lägre. Vattenmängden ska i detta fall vara 1500 l/ha. Använd Mirador® (dos 0,8-1,0 l/ha; 1-2 ggr) som del i en strategi där andra effektiva preparat ingår. Max 2 behandlingar/säsong. Minst 12 dagars intervall mellan behandlingarna.
Kål (rödkål och vitkål, blomkål, broccoli, savoykål, brysselkål, grönkål)	0,8-1,0	41-49	Svartfläcksjuka (<i>Alternaria spp.</i>) Ringfläcksjuka (<i>Mycospora brassicola</i>) Vitrost (<i>Albugo candida</i>)	Måttlig till god effekt mot svartfläcksjuka (<i>Alternaria spp.</i>), ringfläcksjuka (<i>Mycosphaerella brassicicola</i>) och vitrost (<i>Albugo candida</i>). Använd Mirador® (dos 0,8-1 l/ha; 1-2 ggr) som del i en strategi där andra effektiva preparat ingår. Max 2 behandlingar/säsong. Minst 12 dagars intervall mellan behandlingarna.
Kålrot och rova	0,8-1,0	37-39	Svartfläcksjuka (<i>Alternaria spp.</i>) Ringfläcksjuka (<i>Mycospora brassicola</i>) Vitrost (<i>Albugo candida</i>)	Måttlig till god effekt mot svartfläcksjuka (<i>Alternaria spp.</i>), ringfläcksjuka (<i>Mycosphaerella brassicicola</i>) och vitrost (<i>Albugo candida</i>). Använd Mirador® (dos 0,8-1,0 l/ha; 1-2 ggr) som del i en strategi där andra effektiva preparat ingår. Max 2 behandlingar/säsong. Minst 21 dagars intervall mellan behandlingarna.

Gröda	Dos, l/ha	Tidpunkt, utv stadium	Skadegörare	Anmärkningar
Lök (kepalök, schalottenlök, vitlök) och sallatslök	0,5-1,0	15-45	Lökbladmögel (<i>Peronospora destructor</i>) Gråmögelbladfläcksjuka (<i>Botrytis squamosa</i>)	Måttlig effekt mot lökbladmögel och gråmögelbladfläcksjuka. Använd Mirador® (dos 0,5-1,0 l/ha; 1-3 ggr) som del i en strategi där andra effektiva preparat ingår. Max 3 behandlingar/säsong. Max 2 l/ha och säsong. Minst 7 dagars intervall mellan behandlingarna.
Morötter, persiljerot och palsternacka	0,8-1,0	11-49	Mjöldagg (<i>Erysiphe spp.</i>) Alternaria bladfläckar (<i>Alternaria dauci</i>) Cercospora bladfläckar (<i>Cercospora carotae</i>)	Måttlig till god effekt mot mjöldagg och bladfläckar som orsakats av Alternaria och Cercospora. Mot mjöldagg är Mirador® ett komplement till andra fungicider. Max 2 behandlingar/säsong. Minst 7 dagars intervall mellan behandlingarna.
Persilja	0,8-1,0	13-30	Bladmögel (<i>Plasmopara petroselinii</i>) Bladfläckar orsakade av Septoria petroselini	God effekt mot bladmögel i persilja. Effekten kan bli otillräcklig i persilja som skördas flera gånger. God effekt mot <i>Septoria</i> i persilja. Max 2 behandlingar/säsong. Minst 7 dagars intervall mellan behandlingarna.
Purjolök	0,8-1,0	12-47	Purjolöksrost (<i>Puccinia porri</i>) Pappersfläcksjuka (<i>Phytophthora porri</i>) Purpurfläcksjuka (<i>Alternaria porri</i>)	Måttlig till god effekt mot purjorost, pappersfläcksjuka och purpurfläcksjuka. Använd Mirador® (dos 0,8-1,0 l/ha; 1-3 ggr) som del i en strategi där andra effektiva preparat ingår. Max 3 behandlingar/säsong. Max 2 l/ha och säsong. Minst 12 dagars intervall mellan behandlingarna.
Ruccola	0,8-1,0	13-39	Kålbladmögel (<i>Peronospora parasitica</i>)	God effekt mot kålbladmögel om det används förebyggande och behandlingsintervall vid gynnsamma förhållanden är 7 dagar. Max 2 behandlingar/säsong. Minst 7 dagars intervall mellan behandlingarna.
Rödbetor	0,8-1,0	37-39	Ramularia (<i>Ramularia beticola</i>) Bladfläckar orsakade av Cercospora beticola Betmjöldagg (<i>Erysiphe betae</i>) Betrost (<i>Uromyces betae</i>)	Svag till måttlig effekt mot betmjöldagg och Ramularia. Måttlig effekt mot betrost. Måttlig effekt mot <i>Cercospora</i> . Max 2 behandlingar/säsong. Minst 21 dagars intervall mellan behandlingarna.
Sallat	0,8-1,0	13-39	Sallatsbladmögel (<i>Bremia lactuca</i>)	God effekt mot sallatsbladmögel om det används förebyggande och behandlingsintervall vid gynnsamma förhållanden för svampen inte överstiger 7-10 dagar. Max 2 behandlingar/säsong. Minst 7 dagars intervall mellan behandlingarna.

Gröda	Dos, l/ha	Tidpunkt, utv stadium	Skadegörare	Anmärkningar
Sockerbetor	0,8-1,0	37-39	Ramularia (<i>Ramularia beticola</i>) Bladfläckar orsakade av <i>Cercospora beticola</i> Betmjöldagg (<i>Erysiphe betae</i>) Betrost (<i>Uromyces betae</i>)	Svag till måttlig effekt mot betmjöldagg och <i>Ramularia</i> . Måttlig effekt mot betrost. Måttlig effekt mot <i>Cercospora</i> . Max 2 behandlingar/säsong. Minst 21 dagars intervall mellan behandlingarna.
Stjälkselleri	0,8-1,0	11-49	Selleribladfläcksjuka (<i>Septoria apiicola</i>)	Måttlig till god effekt mot selleribladfläcksjuka. Max 2 behandlingar/säsong. Minst 14 dagars intervall mellan behandlingarna.
Äkerböna	0,5-1,0	60-69	Chokladfläcksjuka (<i>Botrytis fabae</i>) Bönrost (<i>Uromyces fabae</i>) Bönfläcksjuka (<i>Ascochyta fabae</i>)	Måttlig till god effekt mot bönfläcksjuka (<i>Ascochyta fabae</i>). Svag mot chokladfläcksjuka och bönrost. Max 1,0 l/ha per säsong. Max 2 behandlingar/säsong.
Ärter (konservärt och till mogen skörd)	0,5-1,0	60-69	Ärtbladmögel (<i>Peronospora viciae</i>) Ärtfläcksjuka (<i>Ascochyta pisi</i>)	Måttlig till god effekt mot ärtfläcksjuka. Svag till måttlig effekt mot ärtbladmögel. Max 1 l/ha och säsong. Max 2 behandlingar/säsong.

Spridningsteknik

Behandla alltid på upptorkad gröda.

Anpassa hastigheten så att bommen går så stabilt som möjligt.

Skyddsutrustning

Vid påfyllning och rengöring av lantbrukssprutan ska följande skyddsutrustning användas:

- Andningsskydd vid risk för inandning
- Kemikaliebeständiga skyddshandskar
- Skyddsglasögon
- Täckande skyddskläder

Följ allmänna hygienåtgärder genom att:

- Undvika kontakt med hud, ögon och kläder
- Avstå från mat, dryck, rökning eller snusning vid arbetsplatsen
- Ta av nedsmutsade kläder
- Förvara skyddsutrustning separat
- Tvätta händer före raster
- Duscha och tvätta alla kläder efter arbetspasset

Blandningar

Mirador © 250 SC kan blandas fysikaliskt med de flesta växtskyddsmedel och kelaterade mikronäringsämnen av god kvalitet. Produkten skall blandas med triazol (Tilt, Stereo, Armure eller Proline) mot bladfläckssjukdomar och med Tern vid mjöldaggsangrepp. Vid insektsangrepp kan Mirador © blandas med Mavrik, Pirimor, eller annan pyretroid.

Med vår nuvarande kunskapsnivå avråds från tankblandning med mangansulfat (risk för utfällning), ammoniumnitrat samt urea (blandning kan ge brännskador på grödan). Läs alltid respektive preparats etikett före användning.

Beredning av sprutvätska

Vid påfyllning av tank:

- Fyll till hälften med vatten
- Följ rekommenderad dos enligt tabellen
- Häll den uppmätta dosen i den halvfyllda tanken
- Tillsätt eventuellt andra medel och resterande vatten under fortsatt omrörning

Sprutvätskan ska vara under omrörning vid transport och sprutningsarbete. Vid tillredning av sprutvätska får ingen vätska komma ut i avlopp, åar eller vattentäcker. Använd en biobädd eller en platta med uppsamling.

Rengöring av sprututrustning.

Rengör sprututrustningen både utvändigt och invändigt.

Börja med invändig rengöring av sprutan:

1. Töm sprutan
2. Tillsätt därefter en tredjedel av sköljvattentankens innehåll och skölj igenom sprutan
3. Spruta ut det använda sköljvattnet i grödan
4. Fyll på med ytterligare en tredjedel vatten
5. Tillsätt lämpligt rengöringsmedel till andra sköljningen
6. Cirkulera medlet och vattnet i systemet och sprid ut
7. Fyll på med en sista tredjedel vatten
8. Cirkulera vätskan i systemet och sprid ut

Fortsätt med utvändigt rengöring av spruta och traktor. Rengör sprututrustning direkt efter användning för att minska risken för kvarlämnade rester av andra medel.

Tomemballage

Tom förpackning får inte återanvändas.

Tomförpackningar ska sköljas omsorgsfullt (minst tre gånger) med vatten som hålls i spruttanken och används vid behandlingen. Låt förpackningen rinna av, upp och ned under minst 30 sekunder. Makhteshim-Agan är anslutet till SvegReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar. Tel 0370-173 85 eller www.svepretur.se för information om uppsamlingsplatser. Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid kommunens återvinningscentral.

Preparatrester, sköljvatten och ej rengjorda förpackningar är miljöfarligt avfall.

Kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning för information om hantering av miljöfarligt avfall.

Förvaring

Lagras frostfritt samt åtskilt från födoämnen och utsäde.

Att beakta

Produktens kvalitet garanteras om varan har erhållits i sluten originalförpackning.

Rekommendationer för produktens användning är inte bindande, men de är baserade på våra senaste kunskaper. Många faktorer såsom väder, jordart, sorter, resistens, sprutteknik, vattenkvalitet och andra användningssätt kan påverka produktens effekt. Makhteshim-Agan Holland B.V. frångår sig ansvar i dessa avseenden. Företaget frångår sig också allt ansvar för skada uppkommen genom felaktigt lagring eller användning av produkten.



MAKHTESHIM
A G A N
BENELUX & NORDIC


Mirador[®]
250 SC



SVAMPMEDEL

Reg. 5021. Behörighetsklass 2L. Endast för yrkesmässigt bruk efter särskilt tillstånd.

Godkänd för bekämpning av svamp i följande grödor:

- Höstvete, vårvete, råg, rågvete, höstkorn, vårkorn, havre, raps, rybs, potatis, sockerbetor, ärtor, åkerbönor, sallatslök, gräslök, jordgubbar, morot, palsternacka, persiljerot, kepalök, scharlottenslök, vitlök, dill, persilja, stjälkselleri, rödkål, vitkål, blomkål, broccoli, savoykål, brysselkål, grönkål, kinakål, sallat, ruccola, purjolök, rödbeta, kålrot, rova, skogsplantskolor och gräsfrö Alla annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits

Läs medföljande anvisningar före användning

Riskupplysningar

Mycket giftig för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Skyddsanvisningar

Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

Använd andningsskydd vid risk för inandning.

Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.

Första hjälpen

Vid inandning, tag ut personen i frisk luft. Sök läkarhjälp vid obehag.

Vid kontakt med ögonen, tag ut kontaktlinser och skölj med vatten vid sveda.

Vid kontakt med huden, tvätta genast med mycket vatten.

Vid förtäring, skölj munnen med vatten, framkalla ej kräkning. Kontakta läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

För mer information se säkerhetsdatablad

För att undvika risker för människa och miljö, följ bruksanvisningen!



Miljöfarlig

Innehåll: Produkten är ett Suspensionskoncentrat (SC) innehållande 250 g/l (22,9 vikt-%) azoxystrobin.

Tomemballage: Företaget är anslutet till SvegReturs insamlings- och återvinningssystem (tel: 0370-173 85 eller www.svepretur.se) Rester, spill och ej regjort tomemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras.

Tillverkare/Innehavare av godkännandet: Makhteshim-Agan Holland B.V., Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden, The Netherlands, www.mabeno.com

© Irvita Plant Protection N.V.- Member of the Makhteshim-Agan Group



Nettoinnehåll: **4x5 L**



UN 3082