MIRADOR® FORTE

Fungicid

ADAMA

Verksamt ämne:
Azoxystrobin 60 g/L (5,7 vikt-%)
Tebukonazol 100 g/l (9,5 vikt-%)
Formulering:
emulgerbart koncentrat (EC)
Registreringsnummer: 5384
Användarkategori: 2L
Verkningsmekanism: FRAC 11, 3

Innehavare av godkännandet:
ADAMA Registrations B.V.
P.O.Box 355
NL-3830 AK Leusden
Nederländerna
www.adama.com

® ADAMA Maktheshim Ltd.

5 L e

Scanna för användning

ANEMIRFSE5LT/01/A
97052050B/201801

MIRADOR® FORTE

Fungicid

Reg. 5384. Användarkategori 2L.

Användningsområden
Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, korn, havre, raps och rybs.

Läs medföljande anvisningar före användning

Varning



Mycket giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Innehåller triisobutyl-fosfat. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Inhämta särskilda instruktioner före användning.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.
Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

Första hjälpen:
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp
För mer information se säkerhetsdatablad.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Avfall: Företaget är anslutet till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem (tel: 0370-173 85 eller www.svepretur.se). Rengjord förpackning kan lämnas till SvepRetur. Rester, spill och ej rengjort tomemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras.

Batchnummer och tillverkningsdatum: se förpackning

8 718077 011905 >

UN 3082

SWEDEN

ANEMIRFSE5LT/01/B
9705205OD/201801

öppna här

MIRADOR® FORTE

Fungicid

Reg. 5384. Användarkategori 2L.

Användningsområden
Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, korn, havre, raps och rybs.

Läs medföljande anvisningar före användning

Varning

Mycket giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Innehåller triisobutyl-fosfat. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Inhämta särskilda instruktioner före användning.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.
Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.



Första hjälpen:
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp
För mer information se säkerhetsdatablad.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Avfall: Företaget är anslutet till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem (tel: 0370-173 85 eller www.svepretur.se). Rengjord förpackning kan lämnas till SvepRetur. Rester, spill och ej rengjort tomemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras.

Batchnummer och tillverkningsdatum: se förpackning

8 718077 011905 >

UN 3082

SWEDEN

ANEMIRFSE5LT/01/B
9705205OD/201801

Risk, skydd och första hjälpen

Användning och dosering

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Mirador® Forte är godkänd för användning i vete, råg, rågvete, korn, havre samt raps och rybs enligt nedanstående tabell:

Gröda	Skadegörare	Behandling			Dos max L/ha	Spridnings-metod
		Tidpunkt, utv.stadie	Karens, dagar	Antal beh.		
Vete, råg, rågvete, korn, havre	Mot svampangrepp	30-59	35	1	1,5 L/ha	Bomspruta
Raps och rybs	Mot svampangrepp	60-69	56	1	2,0 L/ha	Bomspruta

Övriga villkor
Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbrukspruta med bom".

Restriktioner
Mirador® Forte som används enligt rekommenderad mängd, har i utförda försök inte visat några skadeverkningar. Det finns inga restriktioner gällande omsådd eller efterföljande gröda.

ANVISNINGAR OM ANVÄNDNING

Verkningssätt
Mirador® Forte innehåller de två aktiva substanserna, tebukonazol och azoxystrobin. De kompletterar varandra när det gäller effekten på svampsjukdomar samt motverkar uppbyggnad av resistens då de har två olika verkningsmekanismer.

Azoxystrobin tillhör gruppen strobiluriner. Den stoppar svampens utveckling genom att blockera dess andningsprocess. Azoxystrobin verkar systemiskt i plantan och har dessutom en bladgenomträngande (translaminär) effekt. Den preparatet har i första hand en förebyggande effekt men också en kurativ effekt på svampsjukdomar. Tebukonazol är en systemisk fungicid med skyddande, kurativ och hämmande effekt. Den tas snabbt upp i de vegetativa delarna av växten och flyttas främst till nytillväxt hos plantorna i ett tidigt skede.

Resistensrisk
Resistens visar sig genom dålig eller bristande effekt vid behandling. Azoxystrobin tillhör QoI-fungiciderna, FRAC kod 11, och betraktas ha en hög risk för att utveckla resistens. Resistens är känd hos t.ex. vetets svartpricksjuka och mjöldagg, vilket innebär att försämrad effekt är att förvänta mot dessa sjukdomar med azoxystrobin. Tebukonazol tillhör gruppen triazoler, FRAC kod 3. En försämring (sk shifting) av triazolers effekt mot framför allt svartpricksjuka har observerats.

För att undvika uppkomst av resistens, var noggrann med följande:
- Anpassa doseringen efter rådande förhållande (väder, svamptryck)
- Alternera produkter med olika verkningssätt
- Använd den bästa sprutteknikten

DOSREKOMMENDATIONER, VATTENMÄNGD OCH BEHANDLINGSTIDPUNKT

Bäst effekt mot den enskilda svampsjukdomen uppnås när svampen är aktiv och på ett tidigt utvecklingsstadium. Om svampangrepp uppträder tidigt på säsongen eller förekommer under en längre period krävs ofta ytterligare en behandling.

Följ rekommendationerna i tabellen nedan. Den lägre doseringen används förbyggande eller vid begynnande angrepp. På utvecklade angrepp skall den högre dosen användas.
Kontrollera effekten genom att lämna en yta på minst 25 m2 i fältet.

Vattenmängd: 200-300 L/ha

Gröda	Skadegörare	Tidpunkt, utv. stadie	Dosering (L/ha)
Höst- och vårvete	God effekt på gulrost, brunrost och brunfläcksjuka Viss effekt på mjöldagg, svartpricksjuka och vetets bladfläcksjuka	Stadie 30-59 *Vid begynnande angrepp*	1,0-1,5
Höst- och vårkorn	God effekt på kornrost och kornets bladfläcksjuka Viss effekt på mjöldagg och sköldfläcksjuka	Stadie 30-59 *Vid begynnande angrepp*	1,0-1,5
Rågvete	God effekt på gulrost, brunrost och brunfläcksjuka Viss effekt på mjöldagg	Stadie 30-59 *Vid begynnande angrepp*	1,0-1,5

Gröda	Skadegörare	Tidpunkt, utv. stadie	Dosering (L/ha)
Råg	God effekt på brunrost Viss effekt på mjöldagg och sköldfläcksjuka	Stadie 30-59 *Vid begynnande angrepp*	1,0-1,5
Havre	God effekt på kronrost Viss effekt på mjöldagg	Stadie 30-59 *Vid begynnande angrepp*	1,5
Raps och rybs	God effekt på bomullsmögel, gråmögel och svartfläcksjuka	Stadie 60-69	1,0-2,0

SPRIDNINGSTEKNIK

Mirador® Forte är systemisk i uppåtgående riktning. Detta medför att det är viktigt, speciellt i kraftiga grödor, att använda en sprutteknik som säkerställer att också den nedre delen av grödan träffas av sprutvätskan.

Sprutning skall ske under förhållanden som inte ger upphov till vindavdrift. Följ rekommendationerna enligt broschyren ”Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbrukspruta med bom”. Sprutan skall vara funktionstestad och rätt kalibrerad för bästa resultat.

SKYDDSUTRUSTNING

Skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.

Följ allmänna hygienåtgärder genom att:

- Undvika kontakt med hud, ögon och kläder
- Avstå från mat, dryck, rökning eller snusning vid arbetsplatsen
- Ta av nedsmutsade kläder
- Förvara skyddsutrustning separat
- Tvätta händer före raster
- Duscha och tvätta alla kläder efter arbetspasset

BEREDNING AV SPRUTVÄTSKA

Vid påfyllning av tank:

- Fyll till hälften med vatten
- Följ rekommenderad dos enligt tabellen
- Häll den uppmätta dosen i den halvfyllda tanken
- Tillsätt eventuellt andra medel och resterande vatten under fortsatt omrörning

Sprutvätskan ska vara under omrörning vid transport och sprutningsarbete. Vid tillredning av sprutvätska får ingen vätska komma ut i avlopp, åar eller vattentäkter. Använd en biobädd eller en platta med uppsamling.

Rengöring av sprututrustning
Rengör sprututrustningen både utvändigt och invändigt.

Börja med invändig rengöring av sprutan:

1. Töm sprutan
2. Tillsätt därefter en tredjedel av sköljvattentankens innehåll och skölj igenom sprutan
3. Spruta ut det använda sköljvattnet i grödan
4. Fyll på med ytterligare en tredjedel vatten
5. Tillsätt lämpligt rengöringsmedel till andra sköljningen
6. Cirkulera medlet och vattnet i systemet och sprid ut
7. Fyll på med en sista tredjedel vatten
8. Cirkulera vätskan i systemet och sprid ut

Fortsätt med utvändig rengöring av spruta och traktor. Rengör sprututrustning direkt efter användning för att minska risken för kvarlämnade rester av andra medel.

AVFALL

Tom förpackning får inte återanvändas.
Tomförpackningar ska sköljas omsorgsfullt (minst tre gånger) med vatten som hälls i spruttanken och används vid behandlingen. Låt förpackningen rinna av, upp och ned under minst 30 sekunder.
ADAMA är anslutet till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar. Rengjord förpackning kan lämnas till SvepRetur. Tel 0370-173 85 eller www.svepretur.se för information om uppsamlingsplatser.
Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel skall lämnas för materialåtervinning vid kommunens återvinningscentral.
Preparatrester, sköljvatten och ej rengjorda förpackningar är miljöfarligt avfall. Kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning för information om hantering av miljöfarligt avfall.

FÖRVARING

Lagras frostfritt samt åtskilt från födoämnen och utsäde.

ATT BEAKTA

Produktens kvalitet garanteras om varan har erhållits i sluten originalförpackning. Rekommendationer för produktens användning är inte bindande, men de är baserade på våra senaste kunskaper. Många faktorer såsom väder, jordart, sorter, resistens, sprutteknik, vattenkvalitet och andra användningssätt kan påverka produktens effekt. ADAMA Registrations B.V. frântar sig ansvar i dessa avseenden. Företaget frântar sig också allt ansvar för skada uppkommen genom felaktig lagring eller användning av produkten.

MIRADOR® FORTE

Fungicid

Verksamt ämne:
Azoxystrobin 60 g/L (5,7 vikt-%)
Tebukonazol 100 g/l (9,5 vikt-%)
Formulering:
emulgerbart koncentrat (EC)
Registreringsnummer: 5384
Användarkategori: 2L
Verkningsmekanism: FRAC 11, 3

Innehavare av godkännandet:
ADAMA Registrations B.V.
P.O.Box 355
NL-3830 AK Leusden
Nederländerna
www.adama.com

® ADAMA Maktheshim Ltd.

4 x 5 L

ADAMA

ANEMIRFSE5LT/01/C1
97052050S/201801

MIRADOR® FORTE

MIRADOR® FORTE

Fungicid

ADAMA

Verksamt ämne:
Azoxystrobin 60 g/L (5,7 vikt-%)
Tebukonazol 100 g/l (9,5 vikt-%)
Formulering:
emulgerbart koncentrat (EC)
Registreringsnummer: 5384
Användarkategori: 2L
Verkningsmekanism: FRAC 11, 3

Innehavare av godkännandet:
ADAMA Registrations B.V.
P.O.Box 355
NL-3830 AK Leusden
Nederländerna
www.adama.com

® ADAMA Maktheshim Ltd.

4 x 5 L

Scanna för användning

Reg. 5384. Användarkategori 2L.

Användningsområden
Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, korn, havre, raps och rybs.

Läs medföljande anvisningar före användning

Varning

Mycket giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Innehåller triisobutyl-fosfat. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Inhämta särskilda instruktioner före användning.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.
Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.



Första hjälpen:
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp
För mer information se säkerhetsdatablad.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Avfall: Företaget är anslutet till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem (tel: 0370-173 85 eller www.svepretur.se). Rengjord förpackning kan lämnas till SvepRetur. Rester, spill och ej rengjort tomemballage är miljöfarligt avfall och ska destrueras.

Batchnummer och tillverkningsdatum: se förpackning


8 718077 011912 >

UN 3082

SWEDEN

ANEMIRFSE5LT/01/C2
97052050F/201801

MIRADOR® FORTE



SWEDEN

30 x 20 L

ADAMA
NORTHERN EUROPE B.V.

ANEMIRFSE5LT/01/X
97052050M/201801