

Piggfor

Omega X L3310



Omega X L3310 är ett koncentrat som tillsammans med spannmål ger ett foder till lakterande suggor.

Omega X L3310 är ett koncentrat som tillsammans med spannmål ger ett foder till lakterande suggor. Säkra grunden för ett bra produktionsresultat genom att analysera gårdens spannmål och låt din Piggforsäljare optimera ett foderrecept. Rekommenderad inblandning av Omega X L3310 i torrfoder är ca 20%.

Omega X L3310 är anpassat för att i första hand ge ett digivningsfoder men det kan även användas till dräktiga suggor. Fodergivan ökas successivt från dagen efter grisning så att full giva (21 MJ+5,6 MJ NE/smågris) nås på 7-10 dagar. Råvaruvalet i Omega X L3310 är stabilt och brett.

Digivningsfodret baserat på Omega X L3310 används med fördel i ett 2-fodersystem med ett dräktighetsfoder. Foderbyte från dräktighetsfoder till digivningsfodret bör göras ca 1 vecka innan grisning men kan göras tidigare i satellitbesättningar.

Observera att detta är en generell näringsdeklaration. För aktuell information hänvisas till deklaration på följesedel respektive säcketikett.

Specifikation:

Artikelnr: 407532

Näringsinnehåll		Tillsatser	
Vattenhalt, %	10	Selen mg/kg	2.1
Råprotein g/kg	302	Vitamin A, IE/kg	42000
Råfett, g/kg	25	Vitamin D, totalt IE/kg	9020
NEsugg, MJ/kg	6.4	Vitamin D från HyD IE/kg	1640
OE beräknad, MJ/kg	8.6	Vitamin D3, IE/kg	7380
Lysin g/kg	29.6	Vitamin E, mg/kg	760
Metionin g/kg	6.5	Beräknad klimatpåv. I kg CO2-ekv per ton foder	
Kalcium, g/kg	37	Totalt	550
Natrium g/kg	10	varav LU/LUC	130
Växttråd g/kg	89	varav org. jordar	26,7
Aska, g/kg	180		





Klimat och miljö

Fosfor P, g/kg	12
Kalium K, g/kg	12
Kväve N, g/kg	48

Beräknad klimatpåverkan

Fodrets klimatpåverkan har beräknats enligt riktlinjer från RKFS (Regler för beräkning och kommunikation av klimatpåverkan för Foder i Sverige).

Klimatpåverkan för transport från fabrik till kund är beräknat till 6g CO₂ekv/kg foder.

Tillverkas av

Lantmännen Lantbruk, 205 03 Malmö, Telefonnummer: 0771-111 222

Utförande

Produkten tillverkas som värmebehandlat mjöl. HÅLLBARHET: bör förbrukas inom 4 månader från tillverkningsdatum. Fodret ska förvaras torrt.

