Fungicider

Innehåll:	Azoxystrobin 60 g/l (5,7 vikt-%) Tebukonazol 100 g/l (9,5 vikt-%)
Formulering:	Emuglerbart koncentrat (EC)
Förpackning:	5 liter
Registrerade grödor:	Vete, korn, råg, rågvete, havre, raps och ryps.
Användning:	Kontrollera effekten genom att lämna en obehandlad yta på minst 25 m^2 i fältet.
Restriktioner:	Mirador®Forte som används enligt rekommenderad mängd, har i utförda försök inte visat några skadeverkningar. Det finns inga restriktioner gällande omsådd och efterföljande gröda. För att undvika uppkomst av resistens, var noga med dosering efter rådande förhållanden (väder, svamptryck), alternera produkter med olika verkningssätt och använd den bästa sprutteknikten.
Användningsvillkor:	Använd skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd vid hantering.

Adama är en tillverkare av växtskyddsmedel och distribuerar dessa medel i hela världen. Huvudkontor och produktionsanläggningar är baserade i Israel. Mirador® Forte är ett registrerat varumärke som tillhör ADAMA Registrations B.V. i Leusden, Nederländerna.


ADAMA Northern Europe B.V. | POB 355 | NL-3830 AK Leusden, Netherlands
För mer information kontakta
Lars Kruse Andersen +45 51 24 90 70, Rikard Larsson 070-292 22 28.

Medlem i Svenskt Växtskydd. Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
Läs alltid etikett och produktinformation före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler!

ADAMA

www.adama.com

PRODUKTION: ANFANG.SE, TRYCK: TELLOGRUPPEN, SÖDERKÖPING. JANUARI 2018.



Mirador® Forte

Fungicid byggd för både stråsäd och raps

ADAMA

Mirador® Forte har bredden

Mirador® Forte är en fungicid mot svartpricksjuka och som dessutom är stark på rostsjukdomar. Lämplig att använda tidigt på säsongen när vi behöver ha ett komplett skydd även om grödan växer kraftigt eller som en ren axgångsbehandling. Den kan även med fördel användas i raps genom hela blomningen.

Stråsäd


I stråsäd kan Mirador Forte användas från början på stråskjutningen till dess att hela axet/vippan gått ur holk. Den kan med fördel användas mot svartpricksjuka i vete och är en stark fungicid mot gulrost, brunrost, kronrost och kornrost. Dessutom har Mirador Forte en effekt på mjöldagg och kornets bladfläcksjuka. Detta gör att produkten lämpar sig mycket väl att använda tidigt på säsongen för att bekämpa rostangrepp och begynnande bladfläckar eller som en avslutande behandling i slutet på axgången.

Raps

I raps kan Mirador Forte användas genom hela blomningen. I rapsen är Mirador Forte stark på bomullsmögel, gråmögel och svartfläcksjuka, vilket gör den till det självklara valet under blomningen.

Att tänka på

- Är stark på bl.a. rostsvampar och begynnande bladfläckar
- Ger bra skydd åt hela grödan
- Regnfast efter 1 timme
- Kan användas ensam eller i tankblandning







Verkningssätt och användning

Mirador® Forte innehåller de två aktiva substanserna, tebukonazol och azoxystrobin. De kompletterar varandra när det gäller effekten på svampsjukdomar samt motverkar uppbyggnad av resistens då de har två olika verkningsmekanismer.

Azoxystrobin tillhör gruppen strobiluriner. Azoxystrobin verkar systemiskt i plantan och har dessutom en bladgenomträngande (translaminär) effekt. Den har i första hand en förebyggande effekt men också en kurativ effekt på svampsjukdomar.

Tebukonazol tillhör gruppen triazoler och är en systemisk fungicid med skyddande, kurativ och hämmande effekt. Det tas snabbt upp i de vegetativa delarna av växten och flyttas främst till nytillväxt hos plantorna i ett tidigt skede.

Genom att kombinera dessa två aktiva substanser får vi både skydd på undersidan av bladen och av nytillväxten, se figur.



Gröda	Behandling			
	Utvecklings-stadium (BBCH)	Karenstid (dygn)	Max. antal be-handlingar	Max dos/ tillfälle l/ha
Vete, råg, rågvete, havre och korn	30-59	35	1	1,5
Raps, ryps	60-69	56	1	2,0

Vattenmängd: 200-300 l/ha. Bomspruta.