

VÄLBEPRÖVAD TEKNOLOGI



AMISTAR® GOLD är särskilt
anpassad för svampbehandling i
sockerbetor och raps

FÖRBÄTTRAD FÖR DIN GRÖDA



AMISTAR® GOLD har bred effekt och
bekämpar de viktigaste sjukdomarna,
allt i en och samma produkt

 **Amistar® Gold**

syngenta®

Amistar® Gold är ett nytt svampmedel särskilt anpassat för raps och sockerbetor. Till skillnad mot den välbekanta produkten Amistar® är Amistar® Gold uppdaterad med en ytterligare aktiv substans. Amistar Gold innehåller en kombination av Azoxystrobin och Difenoconazole vilket gör den till en mer effektiv och pålitlig lösning.

- Högst avkastning i sockerbetor - i strategi med Comet Pro (Nordic Beet Research, 2017)
- Bred effekt – på grund av två olika aktiva substanser i en produkt
- Resistensmanagement – två verkningsmekanismer förbygger utveckling av resistens

Gröda	Skadegörare	Maxdos (l/ha)	Tidpunkt/ kriterier	Anmärkning
Höstraps och höstrybs	Bomullsmögel (Sclerotinia sclerotiorum), Svartfläcksjuka (Alternaria)	1	BBCH 60-69	Max 1 behandling
Sockerbetor	Rost (Uromyces betae) Mjöldagg (Erysiphe betae) Ramularia (Ramularia beticola) Cercospora- bladplet (Cercospora beticola)	1	BBCH 39-49	Max 1 behandling

Innehåller

125 g/ltr Azoxystrobin + 125 g/ltr Difenoconazole.

Blandbarhet

Produkten kan blandas med alla de viktigaste svamp- insekts-
och ogräsmedlen, även med mikronäring av god kvalitet.

Regnfasthet

Amistar® Gold är regnfast inom två timmar efter avslutad
behandling

Temperatur

Amistar® Gold kan användas när dagstemperaturen överstiger
8-10°C. Effekten av produkten är i övrigt inte särskilt temperatur-
beroende. Bekämpning ska ske morgon eller kväll efetsrom
bladen då är mer aktiva och har ett större upptag.

Rekommendation i Sockerbetor

Amistar® Gold ska användas tidigt i sjukdomsförloppet för att ge
bästa effekt. Använd i den första behandlingen.

Dubbelbehandling

Första behandling:

0,5 – 1 liter / ha Amistar® Gold när angreppen börjar komma (brukar ske i
början av augusti). Bekämpningströskel: 1 av 33 blad angripet före den
15 september. Så fort du hittar ett blad som är angripet av Ramularia,
Cercospora, rost eller mjöldagg är bekämpningströskeln uppnådd. Det
räcker med en enda bladfläck för att bladet ska räknas som angripet.

Andra behandling:

Följ upp med 0,3-0,6 Comet Pro (alternativt 0,4 l/ha Tiro)r 0,3-0,6
Comet Pro i nästa behandling (slutet av augusti)

Enkelbehandling

0,5 - 1,0 l/ha Amistar® Gold + eventuellt 0,3 Comet Pro


NYA MÖJLIGHETER I SOCKERBETSODLINGEN

- Toppavkastning i NBR:s försök 2017, i strategi med med Comet Pro, ledet med högst sockerskörd.

Ger pålitligt skydd mot alla de viktigaste sjukdomarna (Betrost, Mjöldagg, Ramularia, Cercospora).

- Det enda svamppreparatet med två olika aktiva substanser, som har olika verkningsmekanismer, vilket ger en bredare effekt
Källa: L9-8450-2017.

NBR Svampförsök i sockerbeter 2017, relativskörd. Sammanställning av fyra försök.



VARFÖR ÄR AMISTAR GOLD BRA UR RESISTENSSYNPUNKT?

Azoxystrobin

Difenoconazole

För att förebygga resistensutveckling är det viktigt att få in nya aktiva substanser och verkningsmekanismer i strategierna.

Amistar® Gold är ett välkommet tillskott eftersom den utöver en strobilurin innehåller Difenoconazole som verkar på ett annat sätt än de mest använda produkterna i sockerbeter.

Azoxystrobin (125 g/l)

- Är en strobilurin.
- Bred effekt på Cercospora och rost.
- Kan visa förgrönande effekt vilket ökar avkastningen

Difenoconazole (125 g/l)

- Är en triazol. Kombinerar starkt kurativa effekter med god förbyggande effekt
- Bred effekt på mjöldagg, Cercospora, Ramularia, och rost.



Amistar® Gold

syngenta®