




IRONMAX® PRO

FÖR KONTROLL AV SNIGLAR I LANTBRUKSGRÖDOR, GRÖNSAKER,
FRUKT, PRYDNADSVÄXTER OCH VÄXTHUSGRÖDOR

ANVÄNDNINGSKLART BETE SOM INNEHÅLLER 24,2 G/KG JÄRNFOSFAT

20kg



MAXIMUM ATTRACTIVENESS



RESISTANCE TO DISINTEGRATION



FAST ACTION



MANAGED PALATABILITY



CONTROLLED SPREAD

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Skyddsåtgärder för användaren

När så är praktiskt möjligt ska tekniska kontrollåtgärder beträffande operatörens exponering tillämpas utöver följande skyddsutrustning:
ANVÄND LÄMPLIGA SKYDDSHANDSKAR när du hanterar produkten eller applicerar den med hand-hållen utrustning.
Tekniska kontrollåtgärder kan dock ersätta personlig skyddsutrustning om en COSHH-bedömning (Control of Substances Hazardous to Health) visar att de ger ett lika gott eller bättre skydd. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Miljöskydd

Töm ej i avloppet, oskadliggör produkt och förpackning på ett säkert sätt.
Se till att produkten och dess emballage inte förorenar vatten. Rengör inte appliceringsutrustningen i närheten av vattendrag. Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.

Förvaring och bortskaffande

Förvaras oåtkomligt för barn.
Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.
Originalförpackningen och den tomma behållaren får endast användas till avsett ändamål.
Kassera innehållet/emballage genom att lämna det till en auktoriserad entreprenör för hantering av farligt avfall eller till en miljöstation. Tomma rena emballage kan kasseras som icke-farligt avfall.

APPLICERING

IRONMAX PRO kan appliceras med mekanisk spridare eller för hand. Applicering för hand är lämpligt när små ytor ska behandlas som t.ex. växthusgrödor.
Upprätthållandet av pelletsens beständighet under bredspridning och dess bibehållande av retentionsförmågan under fältmässiga förhållanden har inte fastställts.
Var försiktig under appliceringen så att pelletsen inte fastnar på löv, blommor eller andra delar av växten.
Använd mekanisk hantering för behållare som väger mer än 25 kg.

Dosrekommendation

Maximal individuell dos: 7 kg/ha

Intervall och antal behandlingar

Ombehandling kan behövas, särskilt när pelletsen har konsumerats eller vid en ny generation växtskadegörare.
Intervall mellan behandlingar: minst 5 dagar.
Behandling är tillåten upp till den maximala totala dosen på 28 kg/ha per gröda och år.

Behandlingstidpunkt

Bästa resultat uppnås om behandlingen sker innan skadan uppstår. För ettåriga grödor rekommenderas att behandla före uppkomst. Applicera produkten efter att såbäddsberedningen är klar.
Beträffande behandlingstidpunkt ska följande beaktas:
• Upptäckt av växtskadegörare eller sannolikhet för aktivitet.
• Den del av grödan som skadegöraren riktar in sig på; beroende på om det är frön, plantor eller jordbruksprodukter som kan skördas definieras en specifik strategi.
Tidpunkt för senaste behandling: se föregående tabell.

INFORMATION FRÅN FÖRETAGET

Detta avsnitt är inte en del av produktetiketten enligt förordning (EG) nr 1107/2009. Informationen ger ytterligare vägledning om produkten enligt sökandens eget gottfinnande.

Ofrivilligt spill/utsläpp

Personliga skyddsåtgärder
Använd engångshandskar av latex eller liknande mjuka handskar
Miljöskyddsåtgärder och metoder för rengöring/sanering

Samla ihop betet med lämpligt redskap (t.ex. spade eller sopborste) samtidigt som du iakttar instruktionerna ovan. Samla upp produkten genom sopning eller sug. Fånga upp så mycket som möjligt av produkten, placera i en behållare (cylinderkärl/fat) som du märker och kassera sedan med hjälp av en godkänd instans för avfallshantering. OBS: informera miljötillsynsenheten i aktuell kommun om det ofrivilliga spillet/utsläppet kommer ut i ett avlopp som leder till ett vattendrag. Om spillet/utsläppet kommer ut i det allmänna avloppssystemet, kontakta reningsverket eller annan relevant vattenmyndighet.

SPÅRBARHET

Bekämpningsmedel nr. 5378
Klass 2L

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Åkergrödor

Gröda	Utvecklingsstadier
Sockerbeta, foderbeta, rödbeta, kålrot, rova, morot, rotselleri, rädisa	DC 00 – DC 14
Lök, vitlök	DC 00 till skörd
Blomkål, broccoli, kål, brysselkål	DC 00 till skörd
Sallad och andra bladgrönsaker Spenat och liknande bladgrönsaker (såsom portulak, betblad) Örter (såsom körvel, gräslök, bladselleri, persilja, salvia, rosmarin, timjan, basilika, lagerblad, dragon)	
Ärtor och bönor (färska), Ärtor och bönor (torkade)	
Selleri, fänkål, jordärtskocka, purjolök, vår-/salladslök	DC 00 till skörd
Oljegröda (såsom raps, linfrö, vallmo, sesamfrö, solros, sojaböna, senapsfrö, wintersquash och pumpa, safflor, gurkört, oljeädra, hampfrö, ricinfrö)	DC 00 till skörd
Spannmål (vete, korn, havre, råg, rågvete)	DC 00 till skörd
Majs, sockermajs	DC 00 till skörd
Ny betesmark (rajgräs)	DC 00 till skörd
Turf	När som helst

Växthusgrödor

Gröda	Utvecklingsstadier
Tomat, paprika och chili, aubergine	DC 00 till skörd
Gurka, zucchini och sommarsquash, melon, vattenmelon	DC 00 till skörd
Sallad och andra bladgrönsaker Spenat och liknande bladgrönsaker (såsom portulak, betblad) Örter (såsom körvel, gräslök, bladselleri, persilja, salvia, rosmarin, timjan, basilika, lagerblad, dragon)	

(1) från 7 dagar före sådd/plantering

ANVÄNDNING

VIKTIGT: Denna information är godkänd som en del av produktetiketten. Alla instruktioner i detta avsnitt ska läsas noggrant för en säker och framgångsrik användning av produkten.

Varning

Använd för sockerbeta, foderbeta, rödbeta, kålrot, rova, morot, rotselleri, rädisa, oljeväxter och spannmålsgrödor. Torv och gräsmark ger skydd under etableringen av dessa grödor. Att applicera under senare tillväxtstadier kanske inte ger någon fördel.

Denna produkts effektivitet beträffande Arion lusitanicus specifikt har inte påvisats. IRONMAX PRO har inte testats mot sniglar som lever under jord, såsom kölsniglar (t.ex. Milax spp.). Skador på rotknölar orsakade av dessa arter kanske inte kan förhindras.

På grund av järnfosfatets verkningssätt drar sig sniglarna ofta tillbaka under jord och dör efter att ha konsumerat betet och det finns därför få tecken på döda sniglar. Effekten av behandlingen kanske inte är omedelbart synlig. Effektiviteten ska istället mätas genom att undersöka minskningen av ätskador på grödan. Resultatet av behandlingen med IRONMAX PRO ska endast bedömas utifrån minskade skador på grödan.

VIKTIG INFORMATION SKA ENDAST ANVÄNDAS SOM ETT PROFESSIONELLT BLÖTDJURSMEDEL	
Användningsområden: Maximal individuell dos: Maximal total dos: Tidpunkt för senaste behandling:	Ätbara och ej ätbara grödor. Se bruksanvisningen 7 kg produkt per hektar 28 kg produkt per hektar per år Se bruksanvisningen
LÄS ETIKETTEN FÖRE ANVÄNDNING. ATT ANVÄNDA PRODUKTEN PÅ ETT SÄTT SOM INTE ÖVERENSSTÄMMER MED ETIKETTEN KAN UTGÖRA ETT BROTT. FÖLJ RIKTLINJERNA FÖR ANVÄNDNING AV VÄXTSKYDDSMEDEL.	
Distribueras av: Innehavare av tillstånd: DE SANGOSSE SA CS10005 F47480 Pont-du-Casse Frankrike	Marknadsförs av: Lantmännen Lantbruk 205 03 Malmö Sverige Tel: 0771-111 222 lantmannenlantbrukmaskin.se




IRONMAX® PRO

FÖR KONTROLL AV SNIGLAR I LANTBRUKSGRÖDOR, GRÖNSAKER,
FRUKT, PRYDNADSVÄXTER OCH VÄXTHUSGRÖDOR

ANVÄNDNINGSKLART BETE SOM INNEHÅLLER 24,2 G/KG JÄRNFOSFAT

20kg



MAXIMUM ATTRACTIVENESS



RESISTANCE TO DISINTEGRATION



FAST ACTION



MANAGED PALATABILITY



CONTROLLED SPREAD

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Skyddsåtgärder för användaren

När så är praktiskt möjligt ska tekniska kontrollåtgärder beträffande operatörens exponering tillämpas utöver följande skyddsutrustning:
ANVÄND LÄMPLIGA SKYDDSHANDSKAR när du hanterar produkten eller applicerar den med hand-hållen utrustning.
Tekniska kontrollåtgärder kan dock ersätta personlig skyddsutrustning om en COSHH-bedömning (Control of Substances Hazardous to Health) visar att de ger ett lika gott eller bättre skydd. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Miljöskydd

Töm ej i avloppet, oskadliggör produkt och förpackning på ett säkert sätt.
Se till att produkten och dess emballage inte förorenar vatten. Rengör inte appliceringsutrustningen i närheten av vattendrag. Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.

Förvaring och bortskaffande

Förvaras oåtkomligt för barn.
Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.
Originalförpackningen och den tomma behållaren får endast användas till avsett ändamål.
Kassera innehållet/emballage genom att lämna det till en auktoriserad entreprenör för hantering av farligt avfall eller till en miljöstation. Tomma rena emballage kan kasseras som icke-farligt avfall.

APPLICERING

IRONMAX PRO kan appliceras med mekanisk spridare eller för hand. Applicering för hand är lämpligt när små ytor ska behandlas som t.ex. växthusgrödor.
Upprätthållandet av pelletsens beständighet under bredspridning och dess bibehållande av retentionsförmågan under fältmässiga förhållanden har inte fastställts.
Var försiktig under appliceringen så att pelletsen inte fastnar på löv, blommor eller andra delar av växten.
Använd mekanisk hantering för behållare som väger mer än 25 kg.

Dosrekommendation

Maximal individuell dos: 7 kg/ha

Intervall och antal behandlingar

Ombehandling kan behövas, särskilt när pelletsen har konsumerats eller vid en ny generation växtskadegörare.
Intervall mellan behandlingar: minst 5 dagar.
Behandling är tillåten upp till den maximala totala dosen på 28 kg/ha per gröda och år.

Behandlingstidpunkt

Bästa resultat uppnås om behandlingen sker innan skadan uppstår. För ettåriga grödor rekommenderas att behandla före uppkomst. Applicera produkten efter att såbäddsberedningen är klar.
Beträffande behandlingstidpunkt ska följande beaktas:
• Upptäckt av växtskadegörare eller sannolikhet för aktivitet.
• Den del av grödan som skadegöraren riktar in sig på; beroende på om det är frön, plantor eller jordbruksprodukter som kan skördas definieras en specifik strategi.
Tidpunkt för senaste behandling: se föregående tabell.

INFORMATION FRÅN FÖRETAGET

Detta avsnitt är inte en del av produktetiketten enligt förordning (EG) nr 1107/2009. Informationen ger ytterligare vägledning om produkten enligt sökandens eget gottfinnande.

Ofrivilligt spill/utsläpp

Personliga skyddsåtgärder
Använd engångshandskar av latex eller liknande mjuka handskar
Miljöskyddsåtgärder och metoder för rengöring/sanering
Samla ihop betet med lämpligt redskap (t.ex. spade eller sopborste) samtidigt som du iakttar instruktionerna ovan. Samla upp produkten genom sopning eller sug. Fånga upp så mycket som möjligt av produkten, placera i en behållare (cylinderkärl/fat) som du märker och kassera sedan med hjälp av en godkänd instans för avfallshantering. OBS: informera miljötillsynsenheten i aktuell kommun om det ofrivilliga spillet/utsläppet kommer ut i ett avlopp som leder till ett vattendrag. Om spillet/utsläppet kommer ut i det allmänna avloppssystemet, kontakta reningsverket eller annan relevant vattenmyndighet.

SPÅRBARHET

Bekämpningsmedel nr. 5378
Klass 2L

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Åkergrödor

Gröda	Utvecklingsstadier
Sockerbeta, foderbeta, rödbeta, kålrot, rova, morot, rotselleri, rädisa	DC 00 – DC 14
Lök, vitlök	DC 00 till skörd
Blomkål, broccoli, kål, brysselkål	DC 00 till skörd
Sallad och andra bladgrönsaker Spenat och liknande bladgrönsaker (såsom portulak, betblad) Örter (såsom körvel, gräslök, bladselleri, persilja, salvia, rosmarin, timjan, basilika, lagerblad, dragon)	
Ärtor och bönor (färska), Ärtor och bönor (torkade)	
Selleri, fänkål, jordärtskocka, purjolök, vår-/salladslök	DC 00 till skörd
Oljegröda (såsom raps, linfrö, vallmo, sesamfrö, solros, sojaböna, senapsfrö, wintersquash och pumpa, safflor, gurkört, oljeädra, hampfrö, ricinfrö)	DC 00 till skörd
Spannmål (vete, korn, havre, råg, rågvete)	DC 00 till skörd
Majs, sockermajs	DC 00 till skörd
Ny betesmark (rajgräs)	DC 00 till skörd
Turf	När som helst

Växthusgrödor

Gröda	Utvecklingsstadier
Tomat, paprika och chili, aubergine	DC 00 till skörd
Gurka, zucchini och sommarsquash, melon, vattenmelon	DC 00 till skörd
Sallad och andra bladgrönsaker Spenat och liknande bladgrönsaker (såsom portulak, betblad) Örter (såsom körvel, gräslök, bladselleri, persilja, salvia, rosmarin, timjan, basilika, lagerblad, dragon)	

(1) från 7 dagar före sådd/plantering

ANVÄNDNING

VIKTIGT: Denna information är godkänd som en del av produktetiketten. Alla instruktioner i detta avsnitt ska läsas noggrant för en säker och framgångsrik användning av produkten.

Varning

Använd för sockerbeta, foderbeta, rödbeta, kålrot, rova, morot, rotselleri, rädisa, oljeväxter och spannmålsgrödor. Torv och gräsmark ger skydd under etableringen av dessa grödor. Att applicera under senare tillväxtstadier kanske inte ger någon fördel.
Denna produkts effektivitet beträffande Arion lusitanicus specifikt har inte påvisats.
IRONMAX PRO har inte testats mot sniglar som lever under jord, såsom kölsniglar (t.ex. Milax spp.). Skador på rotknölar orsakade av dessa arter kanske inte kan förhindras.

På grund av järnfosfatets verkningssätt drar sig sniglarna ofta tillbaka under jord och dör efter att ha konsumerat betet och det finns därför få tecken på döda sniglar. Effekten av behandlingen kanske inte är omedelbart synlig. Effektiviteten ska istället mätas genom att undersöka minskningen av ätskador på grödan. Resultatet av behandlingen med IRONMAX PRO ska endast bedömas utifrån minskade skador på grödan.

VIKTIG INFORMATION SKA ENDAST ANVÄNDAS SOM ETT PROFESSIONELLT BLÖTDJURSMEDEL	
Användningsområden: Maximal individuell dos: Maximal total dos: Tidpunkt för senaste behandling:	Ätbara och ej ätbara grödor. Se bruksanvisningen 7 kg produkt per hektar 28 kg produkt per hektar per år Se bruksanvisningen
LÄS ETIKETTEN FÖRE ANVÄNDNING. ATT ANVÄNDA PRODUKTEN PÅ ETT SÄTT SOM INTE ÖVERENSSTÄMMER MED ETIKETTEN KAN UTGÖRA ETT BROTT. FÖLJ RIKTLINJERNA FÖR ANVÄNDNING AV VÄXTSKYDDSMEDEL.	
Distribueras av: Innehavare av tillstånd: DE SANGOSSE SA CS10005 F47480 Pont-du-Casse Frankrike	Marknadsförs av: Lantmännen Lantbruk 205 03 Malmö Sverige Tel: 0771-111 222 lantmannenlantbrukmaskin.se




IRONMAX® PRO

FÖR KONTROLL AV SNIGLAR I LANTBRUKSGRÖDOR, GRÖNSAKER,
FRUKT, PRYDNADSVÄXTER OCH VÄXTHUSGRÖDOR

ANVÄNDNINGSKLART BETE SOM INNEHÅLLER 24,2 G/KG JÄRNFOSFAT

20kg



MAXIMUM ATTRACTIVENESS



RESISTANCE TO DISINTEGRATION



FAST ACTION



MANAGED PALATABILITY



CONTROLLED SPREAD

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Skyddsåtgärder för användaren

När så är praktiskt möjligt ska tekniska kontrollåtgärder beträffande operatörens exponering tillämpas utöver följande skyddsutrustning:
ANVÄND LÄMPLIGA SKYDDSHANDSKAR när du hanterar produkten eller applicerar den med hand-hållen utrustning.
Tekniska kontrollåtgärder kan dock ersätta personlig skyddsutrustning om en COSHH-bedömning (Control of Substances Hazardous to Health) visar att de ger ett lika gott eller bättre skydd. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Miljöskydd

Töm ej i avloppet, oskadliggör produkt och förpackning på ett säkert sätt.
Se till att produkten och dess emballage inte förorenar vatten. Rengör inte appliceringsutrustningen i närheten av vattendrag. Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.

Förvaring och bortskaffande

Förvaras oåtkomligt för barn.
Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.
Originalförpackningen och den tomma behållaren får endast användas till avsett ändamål.
Kassera innehållet/emballage genom att lämna det till en auktoriserad entreprenör för hantering av farligt avfall eller till en miljöstation. Tomma rena emballage kan kasseras som icke-farligt avfall.

APPLICERING

IRONMAX PRO kan appliceras med mekanisk spridare eller för hand. Applicering för hand är lämpligt när små ytor ska behandlas som t.ex. växthusgrödor.
Upprätthållandet av pelletsens beständighet under bredspridning och dess bibehållande av retentionsförmågan under fältmässiga förhållanden har inte fastställts.
Var försiktig under appliceringen så att pelletsen inte fastnar på löv, blommor eller andra delar av växten.
Använd mekanisk hantering för behållare som väger mer än 25 kg.

Dosrekommendation

Maximal individuell dos: 7 kg/ha

Intervall och antal behandlingar

Ombehandling kan behövas, särskilt när pelletsen har konsumerats eller vid en ny generation växtskadegörare.
Intervall mellan behandlingar: minst 5 dagar.
Behandling är tillåten upp till den maximala totala dosen på 28 kg/ha per gröda och år.

Behandlingstidpunkt

Bästa resultat uppnås om behandlingen sker innan skadan uppstår. För ettåriga grödor rekommenderas att behandla före uppkomst. Applicera produkten efter att såbäddsberedningen är klar.
Beträffande behandlingstidpunkt ska följande beaktas:
• Upptäckt av växtskadegörare eller sannolikhet för aktivitet.
• Den del av grödan som skadegöraren riktar in sig på; beroende på om det är frön, plantor eller jordbruksprodukter som kan skördas definieras en specifik strategi.
Tidpunkt för senaste behandling: se föregående tabell.

INFORMATION FRÅN FÖRETAGET

Detta avsnitt är inte en del av produktetiketten enligt förordning (EG) nr 1107/2009. Informationen ger ytterligare vägledning om produkten enligt sökandens eget gottfinnande.

Ofrivilligt spill/utsläpp

Personliga skyddsåtgärder
Använd engångshandskar av latex eller liknande mjuka handskar
Miljöskyddsåtgärder och metoder för rengöring/sanering

Samla ihop betet med lämpligt redskap (t.ex. spade eller sopborste) samtidigt som du iakttar instruktionerna ovan. Samla upp produkten genom sopning eller sug. Fånga upp så mycket som möjligt av produkten, placera i en behållare (cylinderkärl/fat) som du märker och kassera sedan med hjälp av en godkänd instans för avfallshantering. OBS: informera miljötillsynsenheten i aktuell kommun om det ofrivilliga spillet/utsläppet kommer ut i ett avlopp som leder till ett vattendrag. Om spillet/utsläppet kommer ut i det allmänna avloppssystemet, kontakta reningsverket eller annan relevant vattenmyndighet.

SPÅRBARHET

Bekämpningsmedel nr. 5378
Klass 2L

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Åkergrödor

Gröda	Utvecklingsstadier
Sockerbeta, foderbeta, rödbeta, kålrot, rova, morot, rotselleri, rädisa	DC 00 – DC 14
Lök, vitlök	DC 00 till skörd
Blomkål, broccoli, kål, brysselkål	DC 00 till skörd
Sallad och andra bladgrönsaker Spenat och liknande bladgrönsaker (såsom portulak, betblad) Örter (såsom körvel, gräslök, bladselleri, persilja, salvia, rosmarin, timjan, basili-ka, lagerblad, dragon)	
Ärtor och bönor (färska), Ärtor och bönor (torkade)	
Selleri, fänkål, jordärtskocka, purjolök, vår-/salladslök	DC 00 till skörd
Oljegröda (såsom raps, linfrö, vallmo, sesamfrö, solros, sojaböna, senapsfrö, wintersquash och pumpa, safflor, gurkört, oljeädra, hamprö, ricinfrö)	DC 00 till skörd
Spannmål (vete, korn, havre, råg, rågvete)	DC 00 till skörd
Majs, sockermajs	DC 00 till skörd
Ny betesmark (rajgräs)	DC 00 till skörd
Turf	När som helst

Växthusgrödor

Gröda	Utvecklingsstadier
Tomat, paprika och chili, aubergine	DC 00 till skörd
Gurka, zucchini och sommarsquash, melon, vattenmelon	DC 00 till skörd
Sallad och andra bladgrönsaker Spenat och liknande bladgrönsaker (såsom portulak, betblad) Örter (såsom körvel, gräslök, bladselleri, persilja, salvia, rosmarin, timjan, basili-ka, lagerblad, dragon)	

(1) från 7 dagar före sådd/plantering

ANVÄNDNING

VIKTIGT: Denna information är godkänd som en del av produktetiketten. Alla instruktioner i detta avsnitt ska läsas noggrant för en säker och framgångsrik användning av produkten.

Varning

Använd för sockerbeta, foderbeta, rödbeta, kålrot, rova, morot, rotselleri, rädisa, oljeväxter och spannmålsgrödor. Torv och gräsmark ger skydd under etableringen av dessa grödor. Att applicera under senare tillväxtstadier kanske inte ger någon fördel.

Denna produkts effektivitet beträffande Arion lusitanicus specifikt har inte påvisats. IRONMAX PRO har inte testats mot sniglar som lever under jord, såsom kölsniglar (t.ex. Milax spp.). Skador på rotknölar orsakade av dessa arter kanske inte kan förhindras.

På grund av järnfosfatets verkningssätt drar sig sniglarna ofta tillbaka under jord och dör efter att ha konsumerat betet och det finns därför få tecken på döda sniglar. Effekten av behandlingen kanske inte är omedelbart synlig. Effektiviteten ska istället mätas genom att undersöka minskningen av ätskador på grödan. Resultatet av behandlingen med IRONMAX PRO ska endast bedömas utifrån minskade skador på grödan.

VIKTIG INFORMATION SKA ENDAST ANVÄNDAS SOM ETT PROFESSIONELLT BLÖTDJURSMEDEL	
Användningsområden: Maximal individuell dos: Maximal total dos: Tidpunkt för senaste behandling:	Ätbara och ej ätbara grödor. Se bruksanvisningen 7 kg produkt per hektar 28 kg produkt per hektar per år Se bruksanvisningen
LÄS ETIKETTEN FÖRE ANVÄNDNING. ATT ANVÄNDA PRODUKTEN PÅ ETT SÄTT SOM INTE ÖVERENSSTÄMMER MED ETIKETTEN KAN UTGÖRA ETT BROTT. FÖLJ RIKTLINJERNA FÖR ANVÄNDNING AV VÄXTSKYDDSMEDEL.	
Distribueras av: Innehavare av tillstånd: DE SANGOSSE SA CS10005 F47480 Pont-du-Casse Frankrike	Marknadsförs av: Lantmännen Lantbruk 205 03 Malmö Sverige Tel: 0771-111 222 lantmannenlantbrukmaskin.se