

DIABOLO®

FUNGICID

NA0123 • 450038

FARA

UFI: 2TR8-R0XA-J00Y-AHR8

- H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H351 Misstänks kunna orsaka cancer.
H410 Mycket giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ ansiktsskydd.
P391 Samla upp spill.
P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.
SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

Första hjälpen

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och miljön, följ bruksanvisningen.

Vid nödsituation, ring 112 - begär giftinformation.



Reg.nr. 4699

Behörighetsklass 2L. Endast yrkesmässig användning.

Läs medföljande anvisningar före användning.

Innehåll:

Produkten är ett lösligt koncentrat (SL) innehållande imazalil 100 g/l (9,3 vikt-%)

Batchnummer och tillverkningsdatum:
Se förpackningen
Förvaras frostfritt
Tom förpackning får inte återanvändas.

Registreringsinnehavare:

Certis Belchim B.V.
Stadsplateau 16 | 3521 AZ Utrecht
Nederländerna

© Diabolo är registrerat varumärke tillhörande
Certis Belchim B.V. Nederländerna

GRUPP

3

FUNGICID



Nordisk Alkali
GROWING TOGETHER

Nordisk Alkali | Kruseg. 19A | 212 25 Malmö | Sverige | Tel: 040 680 85 30
info@nordiskalkali.se | www.nordiskalkali.se

Nettoinnehåll:
5 L

Användningsområde:

Mot svampangrepp i odlingar av potatis genom betning av utsäde. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

Allmän information Diabolo® används för behandling av sättpotatis mot: silverskorv (*Helminthosporium solani*), phomaröta (*Phoma exigua*), torröta (*Fusarium solani* resp. *Fusarium sulphureum*) samt blåsskorv (*Polyscykutum pustulans*).

Användning Bäst effekt fås vid behandling omedelbart efter skörd eller i samband med inlagring. Behandling kan också ske vid uppsortering av potatis inför varen innan knölnarna är väckta. **OBS!** Potatisknölen måste vara i vilstadium, inga vita groddar.

Dosering Endast en behandling med 150 ml/ton sättpotatis. **OBS!** Behandlad potatis får endast användas till utsäde. Överbliven behandlad potatis (ex för stora sättpotatisar) får inte användas som foder till djur eller för humankonsumtion.

Applicering Vid överföring till betningsmaskin ska ett slutet system användas, t ex sugspjunt. Diabolo används utspätt och sprutas ut med finfördelade munstycken eller "spinning disc"-system över det rullband som transporterar potatisen. Det är viktigt att potatisen "rullar" så att hela knölen blir täckt av preparatet. Betning ska ske i ett slutet system. Skyddsplåtar eller liknande vid sidan av rullbandet resp. sprutmunstyckena förhindrar avdrift och ger en jämnare beläggning. Potatisen bör vara så ren och fri från jord som möjligt. Diabolo kan också spädas med vatten, max 2 l vatten/ton potatis.

Märkning av betat usäde Förpackning till utsäde som betats med produkten ska märkas enligt gällande lagstiftning, samt ytterligare villkor enligt beslut från Kemikalieinspektionen.

Personlig skyddsutrustning Vid tillblandning och påfyllning av brukslösning samt vid kalibrering och rengöring av betningsmaskin ska skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon/ansiktsskydd användas. Vid hantering av betat utsäde ska skyddshandskar användas. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Avfallshantering

Tom förpackning får inte återanvändas. De tomma förpackningarna ska sköljas ordentligt med vatten minst tre gånger och ställas upp och ned minst 30 sekunder för avrinning. Sköljvattnet hålls i sprutan och sprutas ut på fältet. Väl rengjorda och torra

plastförpackningar med avtagen skruvkork ska lämnas för energitvättning till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar. Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel lämnas för materialåtervinning vid kommunens återvinningscentral. Företaget är anslutet till SvepRetur (www.svepretur.se). Ej rengjord förpackning och ev. rester av produkten lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Resistenshantering Produkten innehåller den aktiva substansen imazalil som tillhör gruppen imidazoler, FRAC grupp 3. För denna typ av produkter finns risk för resistens kan utvecklas. Råd kring resistenshantering bör följas noga.

UPMA UPMA finns för behandling mot mjöldagg i yrkesmässig odling av gurka i växthus. Innehavaren av produktgodkännandet har inget ansvar för eventuella skador på grödan eller uteblivna effekter vid användning av produkten enligt användningsområdet i ett UPMA-beslut. Det är användaren av produkten som själv bär ansvaret vid användning enligt det utvidgade användningsområdet.

För vidare information gå in på Kemikalieinspektionens hemsida www.kemi.se för att se doseringar, tidpunkter, antal behandlingar och ytterligare villkor.

Observera

Detta medel är prövat i svenska försök. Anvisningarna grundar sig på resultaten från dessa. Då användningen ligger utanför vår kontroll och vi ej kan förutse alla de omständigheter som kan påverka resultatet i det enskilda fallet, kan vi ej påta oss något ansvar för eventuella skadeverkningar. Nytt sortmaterial, förändrad odlingsteknik eller uppkommen resistens kan resultera i att preparatet inte ger önskad effekt eller till och med att skador uppstår på grödan. Tillverkaren ansvarar ej för uppkommen skada på grund av sådana förhållanden eller liknade omständigheter, vilka ej kunnat förutses vid preparatets saluförande. Tillverkaren garanterar för varans kvalitet och jämnhet samt att medlet, under normala förhållanden, är ägnat åt de i bruksanvisningen angivna ändamålen. Tillverkaren fräntar sig däremot allt ansvar för möjliga skador, otillräcklig eller utebliven effekt som har uppstått i forbindelse med köparens inkorrekt lagring, transport, hantering och användning av produkten. Följ alltid anvisningarna för säkert växtskydd.

Minskad dosering ger alltid osäkrare effekter. Nordisk Alkali AB lämnar ingen garanti, vid annat bruk av produkten än det som anges på etiketten.