

Stabilan 750 SL

Bekämpningsmedel klass 2L Reg nr 5408
Växtreguleringsmedel endast för yrkesmässigt bruk
Verksam beståndsdel: Klormekvatklorid 750 g/l

Användningsområde:

För stråförkortning i odlingar av höstvete, vårvete, råg, rågvete, havre och gräsfö.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits som utvidgat användningsområde.
Läs medföljande anvisningar före användningen.

Riskupplysningar

EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

H290 Kan vara korrosivt för metaller.

H302 Skadligt vid förtäring.

H312 Skadligt vid hudkontakt.

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P234 Förvaras endast i originalbehållaren.

P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder.

P301+P312 VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

P362+P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen

SP 1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare

Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av „Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom“.

För mer detaljer om Personligt skydd läs i bruksanvisningen under denna punkt.

Övriga upplysningar:


Tillverkningsdatum: se förpackningen.

Batchnummer – se förpackningen.

Nödtelefonnummer:

112, begär Giftinformationen

Företaget + 43 732 6914 2446



Innehavare av godkännandet:

Nufarm Deutschland GmbH
Im Media Park 4e
50670 Köln
Tyskland
Tel:+492211791790

10L

24898/0418/SE/VS



Nufarm

Grow a better tomorrow.

Bruksanvisning

Preparatbeskrivning

Aktiv substans: Klormekvatklorid 750 g/l

Formulering: Upplösligt koncentrat

Allmänt

Stabilan 750 SL är ett effektivt växtregleringsmedel, som förbättrar rottiltväxten och stråstyrkan hos vete, råg, rågvete och havre samt vid produktion av gräsför.

Verknings sätt

Stabilan 750 SL med den aktiva substansen klormekvatklorid är en systemisk tillväxtregulator som hindrar bildandet av gibberellinsyra. Stabilan 750 har effekt på rotsystem, bestockning, stråstyrka och strålängd. Påverkan på bestockning och rottiltväx sker vid behandling i GS 20-30 medan påverkan på strålängd och stråstyrka sker oberoende av behandlingspunkt. Påverkan på rotsystemet ger ett större och djupare rotsystem. Påverkan på strået sker genom en förkortning mellan internodierna och strået blir samtidigt tjockare med större och stabilare cellväggar. Den genomsnittliga reduktionen av strålängden är omkring 15-20 % för vete och råg och ca 10 % för havre. I gräsför är reduktionen av strålängden cirka 4-13 %, minst hos timotej och mest i hundäxing.

Fröfall som lider av torra bör inte behandlas.

Vid behandling med Stabilan 750 SL stimuleras plantan genom att skapa ett kraftigare rotsystem, bättre bestockning och sätter fler ax per planta. Genom att strået är kraftigare och sundare matas även varje källa i axet på ett bättre sätt. Vid behandling med Stabilan 750 SL kan avmognaden ske någon dag senare tack vare att plantan har haft en gynnsammare tillväxtsituation tack vare ett bättre rotsystem som kan ta upp mer vatten och näring.

Rekommendationer

Användning, dosering och behandlingspunkt

Gröda	Utvecklingsstadier	Dosering, L/ha	Anmärkning
Höstvete	GS 25-30	0,9-1,2 L	
En behandling			
Höstvete			
Delad behandling			
Första behandling	GS 25-30	0,9-1,0 L	Den totala mängden
Andra behandling	GS 30-32	0,3 L	Stabilan får inte överstiga 1,3 L/ha totalt
Vårvete	GS 25-30	0,5-0,9 L	
Rågvete	GS 30-31	1,0 L	
Råg	GS 30-32	0,75-1,5 L	
Havre	Stadium 30-31	1,5 L	
Gräsförfall			
Enkel behandling	GS 30-31	2,0 L	
Gräsförfall, Delad behandling			Den totala maxdosen av Stabilan får inte överstiga 2,0 L/ha och odlingssäsong
Första behandling	GS 30	1,0 L	
Andra behandling	7-14 dagar senare	1,0 L	

Behandlingspunkt

Stabilan 750 SL kan användas när plantorna är i god tillväxt. I vete ger Stabilan 750 SL god stråförkortning vid behandling redan i GS 25, dvs i bestockningsfasen. Behandling med Stabilan 750 SL kan således med fördel kombineras med ogräsbekämpningen i vete. I råg och havre där behandling med Stabilan 750 SL med fördel görs något senare kan behandlingen eventuellt kombineras med bekämpning mot åkertistel och åkermolke. De lägsta doseringarna ger vanligtvis tillräckligt resultat. De högsta doserna används därför vid kraftig gröda och kraftig tillväxt. I gräsförfall ska det gå minst en vecka mellan ogräsbehandlingen med exempelvis Express och till behandling med Stabilan 750 SL. Undvik behandling vid torra eller dåliga tillväxtbetingelser på låtta jordar.

Sprutteknik och optimala förhållanden till behandling

Vätskemängd: 200-300 l/ha
Temperatur: 8-10 ° C, ej näfrost
Munstycke: ISO 03
Lufftektighet: Hög
Tryck: 2-3 BAR
Regnfri tid: 2 timmar

Spridningsteknik

Behandling skall utföras med en bomspruta och sprutan bör vara funktionstestad samt rätt kalibrerad. Anpassa hastigheten så att bommen går så stabilt som möjligt. Då god täckning förbättrar effekten rekommenderas användning av ett munstycke som ger medium till fin dropptorlek.

Överdosering och vindavdrift skall undvikas. Vindavdrift kan ge skada på annan växtlighet. Rekommenderad vätskemängd är 200-300 l/ha. Uptäring av preparatet har gjorts med konventionell sprutteknik, effekten av luftassisterade sprutor bör därför provas fram av användaren.

Blandbarhet

Stabilan 750 SL kan blandas med en flertalet andra medel. Dock ska bruksanvisningen för blandningsprodukten alltid följas noga. Stabilan 750 SL kan blandas med mikronäringsmedel, svampmedel och ogräsmedel. Blandning med mer än en blandningspartner tillsammans med Stabilan 750 SL avrådes. Dosering av Stabilan 750 SL kan reduceras med 20%, när behandlingen görs i blandning med svamp- och ogräsmedel.

Personligt skydd

Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.

Restriktioner

Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbrukspruta med bom".

Hjälpredan beställs på info@distributionsservice.se, beställningsnummer 42132.

Tillredning av sprutvätska

Använd en väl rengjord spruta. Sprutan skall stå så att vattenmiljön inte kan förorenas. Stå på en biobädd, i fält eller på en betongplatta vars avrinning går till en behållare. Var försiktig vid hantering av öppnade förpackningar.

1. Fyll tanken till hälften av den beräknade totala mängden vatten som skall ägta
 2. Starta omrörningen
 3. Häll produkten i preparatpåfyllare eller direkt i tanken
 4. Skölj den tomma förpackning 3 gånger och häll sköljvattnet i tanken
 5. Fyll på resterande mängd vatten
- Behåll omrörningen på och spruta ut omedelbart efter påfyllningen.

Efter utförd blandning/behandling

Rengöring av sprutan och sprututrustning:

Efter avslutad sprutning skall sprutan rengöras grundligt. Bered aldrig mer sprutvätska än vad som går åt för behandlingen. Efter utförd behandling (sprutan helt tömd) sköljs hela sprutan med vatten. Spruta ut sköljvattnet på behandlad mark/gröda. Mer omsorgsfull rengöring kan därefter utföras med alkaliskt rengöringsmedel och vatten. Följ instruktioner på rengöringsmedlet. Rengöringsvattnet sprutas ut på det behandlade fältet på ett säkert, var observant på omgivande miljö.

Överblivna preparater och rester av sprutvätska/rengöring av förpackning:

Basta sättet att minimera preparater är att ett noggrant beräkna hur mycket sprutvätska som går åt vid behandlingen. Tomma preparatförpackningar sköljs omsorgsfullt 3 gånger och sköljvattnet hälls i sprutan. Sprutank och övrig sprututrustning rengörs i fält. All rengöringsvätska sprids ut i det behandlade fältet, var observant på omgivande miljö.

Tomma förpackningar:

Återanvänd inte preparatförpackningarna. Rengjorda förpackningar kan lämnas till Svepretur. För närmare besked om var förpackningar kan lämnas se, www.svepretur.se. (P501) Innehållet/ej rengjord behållare lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Lagring:

Förvara produkt endast i originalförpackning. Förpackningarna skall förvaras i stängt, torrt, svalt och välventilerat godkänt förvaringsutrymme för växtskyddsmedel. Förvaringen skall ske oåtkänlig för barn och husdjur. Livsmedel och foder får inte förvaras på samma ställe som Stabilan 750 SL. Hållbarhet: Minst 2 år i obruten förpackning från produktionsdatum.

Ansvarsangående

Informationen på denna etikk är utformad efter rådande kunskap för hantering och användning av produkten. Om produkten används i enlighet med bruksanvisningen skall produkten fungera enligt rekommendationen. Nufam garanterar att produktens sammansättning är i överensstämmelse med det som anges på etiketten så länge som produkten förvaras i öppnad originalförpackning. Eftersom lagring och användning är utanför företagets kontroll, kan inte tillverkaren hållas ansvarig för direkta och indirekta konsekvenser orsakade av felaktig hantering och användning. Flera betingelser av lokal karaktär kan påverka effekten t ex väderförhållanden, jordart, sortval, behandlingspunkt, spridningsteknik, resistens, blandning med andra produkter. Under ogynnsamma omständigheter kan en eller flera av dessa betingelser påverka effekten av produkten och en skada på grödan kan då inte uteslutas. För sådana konsekvenser kan tillverkare och distributör ej hållas ansvariga.