Piggfor

Selma L101

Selma L101 är ett helfoder för lakterande suggor.

Selma är ett helfoder för lakterande suggor. Det är speciellt utvecklat för besättningar med högproducerande suggor. Fodret lämpar sig också väl i besättningar med stor andel unga djur eller där suggorna har svårt att konsumera tillräckliga mängder. Fodergivan ökas successivt från dagen efter grisning så att full giva (21 MJ+5,6 MJ NE/smågris) nås på 7-10 dagar.

Råvaruvalet i Selma är stabilt och brett. Fodret har en hög energihalt och en extra hög nivå av aminosyror för att stimulera mjölkproduktionen. Selma innehåller organisk syra och fytas som ökar smältbarheten på mineraler.

Selma används med fördel i ett 2-fodersystem med Diana eller Dolly som dräktighetsfoder. Foderbyte från dräktighetsfoder till Selma bör göras ca 1 vecka innan grisning men kan göras tidigare i satellitbesättningar.

Observera att nedanstående tabell är en generell näringsdeklaration. För aktuell information hänvisas till deklaration på följesedel respektive säcketikett.

Specifikation:

Artikelnr: 406508

Näringsinnehåll	
Vattenhalt, %	12
Råprotein g/kg	160
Råfett, g/kg	47
NEsugg, MJ/kg	9.9
OE beräknad, MJ/kg	13.2
Lysin g/kg	9.4
Metionin g/kg	2.9
Kalcium, g/kg	7
Natrium g/kg	2
Växttråd g/kg	46
Aska, g/kg	50

Tillsatser	
Selen mg/kg	0.5
Vitamin A, IE/kg	8200
Vitamin D, totalt IE/kg	1700
Vitamin D från HyD IE/kg	300
Vitamin D3, IE/kg	1400
Vitamin E, mg/kg	165

Beräknad klimatpåv. I CO2-ekv	
Exklusive LU/LUC, kg/ton	400
Inklusive LU/LUC, kg/ton	440

Klimat och miljö	
Fosfor P, g/kg	6
Kalium K, g/kg	7
Kväve N, g/kg	26

Piggfor

Selma L101

Beräknad klimatpåverkan

Fodrets klimatpåverkan har beräknats enligt riktlinjer från RKFS (Regler för beräkning och kommunikation av klimatpåverkan för Foder i Sverige).
Klimatpåverkan för transport från fabrik till kund är beräknat till 8,5 g CO2ekv/kg foder.

Tillverkas av

Lantmännen Lantbruk, 205 03 Malmö, Telefonnummer: 0771-111 222

Utförande Pelletskross

Produkten tillverkas som pelletskross. **HÅLLBARHET**: bör förbrukas inom 4 månader från tillverkningsdatum. Fodret ska förvaras torrt.